

# ダブルシューター™ SE

## 園芸用殺虫剤

ダブルのパワーで、きゅうり・なす・トマト・ミニトマト・ピーマン・ねぎ等の主要害虫をこの1剤が防除！

- ・天然物由来の2成分を配合した殺虫剤。
- ・コナジラミ類の全ステージ(卵・幼虫・成虫)に優れた効果。
- ・薬剤感受性が低下したハダニ類、アザミウマ類にも有効。

**トマト、ミニトマトで適用拡大！  
「トマトキバガ」に使えるようになりました。**



**畑の主要害虫を発生させない、  
増やさない！**


登録番号：第24055号 ■有効成分：脂肪酸グリセリド…75.0% スピノサド…5.0% ■性状：淡黄色水性和性粘稠懸濁液体 ■有効期限：4年 ■包装：500ml×20本

### 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ネギハモグリバエ	1,000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	—	3回以内	
きゅうり メロン	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 ウリノメイガ			発生初期	収穫前日まで			2回以内	2回以内
ピーマン	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ								
トマト ミニトマト	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 オオタバコガ トマトキバガ								
なす	ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類 オオタバコガ								
すいか	アザミウマ類 ハダニ類								
いちご	アザミウマ類 ハダニ類 コナジラミ類								
花き類・観葉植物	ハダニ類 アザミウマ類								


### 試験成績

#### ●コナジラミ類に対する防除効果試験




●試験場所：サンケイ化学(株) 研究部【社内試験】 ●作物名：なす(千両二号) ●対象害虫：オンシツコナジラミ ●試験方法：オンシツコナジラミ成虫放虫試験 ●調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布3日後、7日後、14日後の成虫及び幼虫数を調査 ●処理日：2016年6月23日

#### ●アザミウマ類に対する防除効果試験



●試験場所：岩手県農業研究センター ●作物名：ピーマン(京鈴) ●対象害虫：ヒラズハナアザミウマ ●試験方法：自然発生試験 ●調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布3日後、7日後、14日後の雌成虫数を調査 ●処理日：2018年7月10日

#### ●トマトキバガに対する防除効果試験



●試験場所：熊本県農業研究センター生産環境研究所 ●作物名：トマト(ハウス桃太郎) ●対象害虫：トマトキバガ(放虫/中発生) ●試験方法：6月23日に成虫5頭/株を放虫。6月27日成虫を除去 ●調査方法：全葉に寄生しているトマトキバガ幼虫を齢期別に計数 ●処理日：2022年7月1日

### ⚠ 使用上の注意事項

- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布の際は、葉裏等に散布むらを生じないように丁寧に散布してください。
- キャブタンを含む農薬またはアゾキシストロピンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は被害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 花き類・観葉植物に使用する場合は、品種、栽培条件等により花卉、苞、葉に被害を生じる場合がありますので、事前に安全を確認して使用してください。特に結露期以降の散布は注意してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれがある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。
  - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

●本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

### ⚠ 水産動植物に係る注意事項

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

製造  
**コルテバ・ジャパン株式会社**  
 〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号  
 山王パークタワー  
<https://www.corteva.jp/>



取扱

本資料は2023年7月現在の知見に基づき、作成されています。