

**만 코 제 브** 수화제  
 (상표) 다이센엠-45·성보만코지·  
 탄자비·아리만코지·  
 동방만코지·선문만코지

유효성분 : mancozeb ..... 75%  
 기 타 : 계면활성제, 증량제 ..... 25%  
 계 통 : 유기유황계

**독 성 : 저독성, 어독성 II 급**

**【적용병해충 및 사용량】**

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
사 과	탄 저 병	6월상순부터 10일간격	33g	수확 30일전까지 사용	5회 이내
	갈 색 무늬 병				
	검 무늬 싹음 병				
	점 무늬 낙엽 병	꽃이 피기전 및 꽃이 진후 10일경부터 10일간격	40g		
포 도	새 눈 무늬 병	발병초부터 10일간격	33g	수확 30일전까지 사용	3회 이내
감 귤	탄 저 병	6월상순부터 10일간격	33g	수확 21일전까지 사용	4회 이내
	검은점 무늬 병	발생초기			
	녹 응 애				
배	검은 별 무늬 병	5,6월과 10월에 10일간격	40g	수확 14일전까지 사용	5회 이내
감 (단감포함)	동근 무늬 낙엽 병	6월상순부터 10일간격	40g	수확 45일전까지 사용	2회 이내
	탄 저 병	6월중순부터 10일간격			
양 파	노 균 병	발병초부터 7일간격	33g(120ℓ/10a)	수확 7일전까지 사용	5회 이내
감 자	역 병	발병직전부터 7~10일간격	40g	수확 14일전까지 사용	4회 이내
수 박	탄 저 병			수확 5일전까지 사용	1회 이내
참 깨	잎 마 림 병			수확 7일전까지 사용	
땅 콩	검은 무늬 병	발병초부터 10일간격	33g, • 40g	수확 14일전까지 사용	5회 이내
인 삼	점 무늬 병			수확 45일전까지 사용	

**【사용방법】**

1. 희석할 때 전착제를 가하여 사용하면 약효가 증진됩니다
2. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [(10a당 살포물량 : 과 수류(200~450ℓ), 포도(200~300ℓ), 채소류/화훼류(150~200ℓ)](팜한농에 한함)

**【특 징】**

1. 이 농약은 유기유황계 살균제입니다

**⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】**

1. 온도와 습도가 매우 높은 조건하에서는 저항력이 약한 유묘기에는 약해가 발생할 우려가 있습니다.
2. 이 농약은 알칼리성 약제(석회보르도액, 석회황합제)와의 혼용 및 1주일 이내의 근접 살포시 약해가 발생할 우려가 있으니 사용하지 마십시오.

**⚠ 【안전 및 기타 주의사항】**



1. 습도가 높거나 고온에서는 주성분의 분해가 심하므로 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

**【등록회사】** 다이센엠-45(경농, 팜한농) 성보만코지(성보화학) 탄자비(•한국삼공) 아리만코지(농협케미컬) 동방만코지(동방아그로) 선문만코지(선문그린)