

펜부코나졸 액상수화제
(상표) 바톤

유효성분 : Fenbuconazole 6%
기 타 : 계면활성제, 소포제, 증점제, 방부제, 동결방지제, 증량제 94%
계 통 : 트리아졸계

독 성 : 저독성 · 어독성 II급

【적용병해충 및 사용량】

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
오 이	흰 가 루 병	발병초 10일간격 경엽처리	20mℓ	수확 2일전까지 사용	3회이내
	수 박	덩 굴 마 림 병		발병초 7일간격 경엽처리	수확 7일전까지 사용
배	검 은 별 무 닌 병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전까지 사용	4회이내
	복 송 아	잿 빛 무 닌 병			
사 과	겉 무 닌 썩 음 병	6월중순부터 10일간격 경엽처리		수확 30일전까지 사용	5회이내
오 미 자	점 무 닌 병	발병초 10일간격 경엽처리			3회이내
딸 기	흰 가 루 병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일전까지 사용	2회이내

【특 징】

1. 이 농약은 트리아졸계의 약제로서 예방 및 치료효과를 겸비한 약제입니다.

⚠ 【약효 · 약해에 관한 주의사항】

1. 석회유황합제, 석회보르도액과 같은 알칼리성 약제와는 섞어쓰지 마십시오.
2. 이 농약은 중복살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복살포하지 마십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】

1. 이 농약은 영하 5도(℃) 이하에서는 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 5도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.
2. 살포 작업은 한사람이 2시간 이상 계속하지 마십시오.

【해독방법】

1. 중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
2. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오.