

할록시포프-아르-메틸
유 제
(상 표) 슈퍼갤런트

유효성분 : haloxyfop-R-methyl 10%
기 타 : 계면활성제, 용제 90%
계 통 : 폐녹시계

독 성 : 보통독성, 어독성 I 급



【적용대상 및 사용량】

작 물 명	적용잡초	사용적기 및 방법	물20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약 량	살 포 량
콩	일년생잡초 (화본과)	화본과잡초 3~5엽기 경엽처리	12ml	60ml	100~120 ℓ
양 파			10ml	50ml	
파			12ml	60ml	
마 늘			10ml	50ml	
참 외					
도 라 지					

【사용방법】

1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 잡초에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
2. 이 약제는 화본과 경엽처리 제초제로 바랭이, 강아지풀, 독새풀 등과 같은 화본과 잡초가 발생된 밭에 사용하는 약제입니다.

【특 징】

1. 이 농약은 아릴옥시페녹시프로피오네이트계로 경엽처리형 제초제입니다.
2. 이 농약은 선택성제초제로서 피, 바랭이, 강아지풀, 독새풀 등 화본과 잡초에는 특이한 살초효과가 있으나 명아주, 비름류 등의 광엽잡초에는 효과가 없습니다.
3. 이 약제는 침투이행성이 신속하여 잡초의 잎이나 줄기에 부착된 약액이 마른후(약제처리 3~4시간)에 비가 오더라도 살초효과에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】



1. 벼, 보리, 옥수수 등의 화본과 작물 및 화본과 목초에는 약해가 심하므로 주위에 화본과 작물이 있을 경우 약이 비산되지 않도록 주의하여 주십시오.
2. 화본과 잡초를 완전히 고사시키기까지는 2주이상 소요되므로 중복 살포하지 않도록 주의하십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】

1. 이 농약은 0도(°C) 이하에서는 결빙될 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 0도(°C) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.

화기엄금