

트리사이클라졸 수화제
액상수화제

유효성분 : Tricyclazole (수화제)75%, (액상수화제)41.7%
기 타 : (수화제)계면활성제, 보조제, 증량제 25%
(액상수화제)계면활성제, 보조제, 소포제, 방부제, 증량제 58.3%
계 통 : 트리아졸계

[적용병해충 및 사용량]

[수화제] 상표 : 유원빔, 유일빔, 트리빔, 미스타빔, 케이씨트리졸 **보통독성**

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1000㎡(10a)당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	시기	횟수
벼	잎도열병	발병직전 또는 발병초기 경엽처리	10g	40~50g	80~100ℓ	수확 21일 전까지 사용	4회 이내
	잎도열병(ULV)		222g	33g	3ℓ		
	잎도열병(육묘상)	이앙 1일전 또는 당일육묘상처리	80g	2g/상자	0.5ℓ /상자		
	목도열병	이삭패기 7일전부터 수전기 경엽처리	10g	70~80g	140~160ℓ		
	목도열병(ULV)		333g	50g	3ℓ		
	세균성벼알마름병	출수직전부터 7일간격 경엽처리	10g	70~80g	140~160ℓ		
깨씨무늬병	발병초기 7일간격 경엽처리						

[액상수화제] 상표 : 유원빔 **보통독성**

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1000㎡(10a)당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	시기	횟수
벼	도열병	잎도열병 : 발병직전 또는 발병초기	10mℓ	50~60mℓ	100~120ℓ	수확 21일 전까지 사용	4회 이내
		목도열병 : 이삭패기 7일전부터 직전		70~80mℓ	140~160ℓ		
	잎도열병(ULV)	발병초	400mℓ	60mℓ	3ℓ		
	목도열병(ULV)	이삭패기 7일전부터	588mℓ	88.2mℓ			
	깨씨무늬병	발병초 7일간격	10mℓ	70~80mℓ	140~160ℓ		
세균성벼알마름병	출수직전부터 7일간격						

[사용방법] [수화제·액상수화제] 1. 장마철에는 비가 멈춘 틈을 타서 약을 뿌려 방제시기를 놓치지 않도록 하십시오.

[수화제] 1. 희석할때 전착제를 가하여 사용하면 약효가 증진됩니다.

2. 도열병 발생이 심할때에는 1차 약제를 뿌린지 15~20일 후에 한번 더 뿌리십시오.

3. 목도열병 방제시 이삭패기 7일전에 약제살포 후 계속 가지도열병 및 벼알도열병의 발생이 우려될 때에는 수전기경에 한번 더 약을 뿌리십시오.

4. 육묘상(30×60×3cm)에 사용할 때에는 이 농약을 어린모의 위에서부터 물뿌리개로 골고루 뿌려 육묘상에 관주하십시오.

[특징] [수화제·액상수화제] 1. 이 농약은 트리아졸계로 침투이행성이며 예방효과가 크고 약효 지속기간이 긴 약제입니다.

[수화제] 1. ULV(고농도 소량살포)의 살포량 3ℓ(10a)는 유인 항공방제에서의 살포기준 물량과 같은 것으로 미세한 입자로 안개나 이슬처럼 비임을 적셔주게 됩니다.

⚠ [약효·약해에 관한 주의사항]

[수화제] 1. 약을 뿌린 후 간혹 벼 잎색이 황변하는 경우가 있으나 이것은 약해가 아닌 생리적 현상으로 수량에는 지장이 없습니다.

2. 육묘상에 이 농약을 처리한 후 이앙이 지연되어 수일간 방치될 경우에는 약해의 우려가 있으니 사용시기를 잘 지키십시오.

3. 육묘상에 사용할 때는 분무기로 살포하면 약해의 우려가 있으니 반드시 물뿌리개로 관주해 주십시오.

⚠ [안전 및 기타 주의사항]



1. 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

[해독방법] 1. 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내십시오.

[등록회사] [수화제]유원빔(판매-유원예코사이언스) 유일빔(유일) 트리빔(대유) 미스타빔(한얼씨아인스) 케이씨트리졸(KC생명과학)

[액상수화제]유원빔(판매-유원예코사이언스)