

파목사돈·옥사티아피프로린  
액상수화제  
(상 표) **조르벡바운티**

유효성분 : Famoxadone ..... 20.0%  
Oxathiapiprolin ..... 2.0%  
기 타 : 계면활성제, 방부제, 동결방지제, 방부제, 증점제, 증량제 ..... 78.0%  
계 통 : 옥시졸린디온계+이속사졸린계

독 성 : 저독성·어독성 I 급



**【적용병해충 및 사용량】**

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물20ℓ 당 사용약량	안전사용기준		
				시 기	횟 수	
감 자 고 추 (단고추류 포함)	역 병	발병직전 7일간격	10ml	수확 14일전까지 사용	4회이내	
		발병직전부터 10일간격		수확 3일전까지 사용	3회이내	
양 파 참 외	노 균 병	발병초 7일간격		수확 14일전까지 사용		3회이내
				수확 3일전까지 사용		
토 마 토 (방울토마토 포함)	역 병	발병초 10일간격		수확 2일전까지 사용		
				수확 2일전까지 사용		
포 도 참 개	노 균 병	발병초 10일간격	수확 21일전까지 사용	2회이내		
			수확 30일전까지 사용			

**【사용방법】**

- 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.  
[10a당 살포물량 : 포도(200~300L), 채소류/화훼류(150~200L)]
- 액상수화제 특성상 용기내 내용물이 일부 남을 수 있으므로 충분히 배출시켜 주십시오.

**【특 징】**

- 이 농약은 병원균 미토콘드리아에 작용하여 호흡을 저해하는 옥시졸린디온계인 파목사돈과 이속사졸린 계통의 새로운 살균제(작용기구 : F9)로, 예방 및 치료효과가 있습니다.
- 내우성이 우수하고 약효가 오랫동안 지속됩니다.

**⚠【약효·약해에 관한 주의사항】**

- 효율적인 방제와 저항성 관리를 위하여 다른 계통의 살균제와 혼용 및 교호 살포하고, 3회 이상 연속살포하지 마십시오.
- 작물 재배기간 중 노균병 방제를 위한 일반적인 처리횟수의 1/3이하로 사용하십시오

**⚠【안전 및 기타 주의사항】**

