

벤설퓨론메틸 · 뷰타클로르
입 제
(상 표) 만 드 리

유효성분 : bensulfuron-methyl 0.17%
butachlor 2.5%
기 타 : 계면활성제, 보조제, 증량제 97.33%
계 통 : 혼합제(설폰닐우레아계+클로로아세트아니라이드계)

독 성 : 저독성, 어독성 II급



【적용대상 및 사용량】

작 물 명	적용잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
벼 (손이앙 및 기계이앙벼)	일년생잡초(마디꽃, 발뚝외풀) 다년생잡초(울방개, 올챙이고랭이, 가래, 너도방동사니, 올미, 벼풀)	써레질후 7~9일 (이앙후 5~7일피 0.7엽기) 수면처리	3kg
손이앙벼	일년생잡초(피, 물달개비)		

【특 징】

1. 이 농약은 일년생 및 다년생 잡초발생전 수면처리형 제초제입니다.
2. 이 농약은 일반적인 논포장 조건에서 약효가 35~40일 동안 지속됩니다.

【사용방법】

1. 논바닥의 정지작업을 균일하게 하여 모가 반드시 2~3cm 깊이로 심기도록 하고 이앙후 5~7일경에 물을 5cm이상 깊이 댄 후 손이나 살림기로 논전면에 골고루 뿌리십시오.
2. 써레질로부터 이앙까지의 기간(5일이상)이 길어질 경우에는 이앙전에 일년생 이앙전처리제초제를 살포하시고 이앙전처리제 살포 후 15일경에 이 약제를 처리하면 더욱 효과적입니다.
3. 울방개를 방제하기 위해서는 사용적기 및 방법 범위안에서 가능한 늦게 살포하는 것이 더욱 효과적입니다.
4. 이앙후에 보식할 경우에는 이앙후 1일 이내에 이앙심도가 2cm이상 되게 이앙후 약제를 뿌리십시오.

⚠ 【약효 · 약해에 관한 주의사항】

1. 약을 뿌린 후에 물을 빼면 약효가 떨어질 수 있으니 약제 처리후 4~5일 동안은 물을 빼거나 흘러 넘치지 않도록 주의 하십시오.
2. 미숙유기물을 사용한 경우에는 가스발생에 의해 벼의 활착력이 떨어져 약해 발생이 우려되니 사용하지 마십시오. 단 수확후 생짚을 논에 사용한 후 가을갈이를 하여 생짚이 충분히 썩도록 한 논에서는 사용 가능합니다.
3. 울방개 또는 벼풀의 발생이 많은 논에는 본 약제를 써레질 후 7~9일경에 1차 처리하고, 1차처리후 15~20일경에 2차 처리하면 이들 잡초를 효율적으로 방제할 수 있습니다.
4. 기계이앙논에 보식할 경우에는 보식후 약제를 뿌려주십시오.
5. 약을 뿌린후 이상고온이 수일간 계속되면 초기생육(분얼, 초장등)이 억제될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
6. 저항성이 의심되는 벼풀에는 효과가 떨어짐으로 사용하지 마십시오.
7. 이 농약은 다음의 설폰닐우레아계 저항성잡초(물달개비, 올챙이고랭이등)에는 효과가 없으며 연용시 대량발생이 우려됩니다.

미꾸리에 독성 강함