

사이목사닐 · 만코제브수화제
(상표) **커지-엠**

유효성분 : cymoxanil 6%
 mancozeb 50%
기 타 : 계면활성제, 보조제, 증량제 44%
계 통 : 혼합제(싸이아노아세트아미드계+유기유황계)

독 성 : 저독성

【적용병해충 및 사용량】

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
오 이 포 도	노 균 병	발병초 7일간격	40g	수확 3일전까지 사용	5회 이내
		발병초 10일간격		수확 21일전까지 사용	3회 이내
감 자 수 박	그 역 병	발병초 7일간격		수확 7일전까지 사용	5회 이내
					4회 이내

【사용방법】

- 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.
[[10a당 살포물량 : 포도(200~300 ℓ), 채소류/화훼류(150~200 ℓ)]

【특 징】

- 이 농약은 싸이아노아세트아미드계의 사이목사닐과 유기유황계의 만코제브와의 합제로 치료 및 예방효과가 있습니다.
- 이 농약은 병원균의 생활사 전반에 효과가 있으며, 내우성이 우수합니다.

⚠ 【약효 · 약해에 관한 주의사항】

- 알칼리성 약제(석회보르도액, 석회유황합제)와 1주일 이내의 근접살포시에는 약해의 우려가 있으므로 근접살포하지 마십시오.