



**Protection supérieure de longue durée
contre le mildiou**

Zorvec[®]

FONGICIDE

ZORVEC®:

LA « SOLUTION » CONTRE LE MILDIOU EN TOUTES SITUATIONS

2021, une année à forte pression de mildiou qui a révélé toute la puissance du Zorvec plus partenaire ou Zorvec Endavia traité pendant la phase de croissance rapide. A la mi-saison, début août, l'effet résiduel du Zorvec était toujours bien visible et le mildiou était sous contrôle.

UNE SOLUTION « HIGH TECH » EN DÉBUT DE VÉGÉTATION



Zorvec appartient à une nouvelle famille chimique. Cette molécule inhibe une protéine intervenant dans la formation des membranes cellulaires (inhibiteur de l'OSBP-FRAC 49).

Zorvec agit sur un nouveau site d'action et combat toutes les souches de mildiou même les plus agressives (souches EU-36 et EU-37).

Zorvec est un fongicide translaminaire et systémique qui protège les nouvelles feuilles.

Zorvec est doté d'une longue persistance d'action qui permet d'allonger l'intervalle entre 2 traitements : intervalle classique + « 3-4 jours » quelle que soit la pression.

Zorvec est souple d'emploi, il est rapidement mis à l'abri du lessivage par la pluie (20 minutes).

Zorvec est un fongicide « unisite ».

Pour prévenir l'apparition de résistance, Zorvec Enicade s'utilise en préventif et toujours en mélange avec un partenaire ayant un mode d'action différent.

Zorvec Endavia est une formulation prête à l'emploi à base de Zorvec + Benthiavalicarb. Il s'utilise seul.

SES CARACTÉRISTIQUES

**RESISTANT
AU LESSIVAGE**



**APRÈS 20
MINUTES**

Zorvec est rapidement mis à l'abri du lessivage par la pluie (20 minutes)

PROTEGE

les nouvelles pousses



Zorvec est un fongicide translaminaire doté d'un effet systémique pour protéger les nouvelles feuilles.

3-4 JOURS SUPPLÉMENTAIRES



PROTECTION

Zorvec protège la culture 3-4 jours supplémentaires par rapport aux produits standards.



LA RÉFÉRENCE « TECHNIQUE » SUR PHYTOPHTORA INFESTANS

Euroblight est un groupe d'experts scientifiques qui évalue techniquement les fongicides.

Zorvec Enicade et Zorvec Endavia démontrent une excellente efficacité sur le mildiou de la feuille (note la plus élevée) et de la tige tout en protégeant les nouvelles feuilles.

Ces 2 produits ont une très bonne résistance au lessivage permettant plus de flexibilité dans les schémas de traitements par conditions variables.

Euroblight : évaluation technique du Zorvec Enicade et Endavia

	Protection feuillage	Protection nouvelles pousses	Protection de la tige	Action préventive	Résistance au lessivage
Zorvec Enicade®	4,9*	++(+)	++(+)	+++	+++
Zorvec Endavia™	4,9	++(+)	++(+)	+++	+++

Source : tableau Euroblight (www.euroblight.net) * Zorvec Enicade® + produit partenaire

RÉSULTATS D'ESSAIS EN BELGIQUE, 2021

Essai Inagro, Roeselare
Variété : Fontane

Efficacité de 3 applications de Zorvec en bloc comparée à 4 traitements de produits de référence pulvérisés en bloc pendant la phase de croissance active.



Bloc R



Bloc I



Bloc Zorvec



Zorvec s'applique dès le 3ème traitement pendant la phase de croissance rapide.

Produit	Agréation N°	Doses	Nombre d'applications	Stade d'application
Zorvec Enicade®	10742P/B	150 ml/ha + partenaire	4	Phase de croissance rapide
Zorvec Endavia™	11063P/B	0,4 L/ha	4	Phase de croissance rapide


POSITIONNEMENT EN DÉBUT DE CROISSANCE RAPIDE



La phase de croissance rapide est vraiment la période la plus critique pour le mildiou sur feuille. Grâce à sa redistribution dans la plante, effet diffusant ascendant, Zorvec protège toutes les nouvelles feuilles néoformées.

Cette période est aussi favorable à l'apparition du mildiou de la tige. Appliqué en préventif & début de végétation, Zorvec atteint plus facilement sa cible pour maîtriser ce champignon.

SCHÉMA CONSEILLÉ



Zorvec® + partenaire ou Zorvec Endavia® s'utilise en bloc de 3 pulvérisations successives à partir du 3ème traitement en fonction du développement de la culture ou sur base des avertissements mildiou.

L'intervalle de traitement varie en fonction de la pression de mildiou : intervalle des produits standards + 3-4 jours. Une 4ème application est autorisée si la culture est saine.

En présence de mildiou, utiliser un produit stoppant et traiter Zorvec 3 jours plus tard.