

Starane™ Forte

HERBICIDE

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEDBLADIGEN IN WINTER- EN ZOMERGRANEN, GRASLAND-WEILAND, RAAIGRAS, GAZONS EN GRASVELDEN, GOLFTERREINEN, (SUIKER) MAÏS, UIEN (DROOGGEOOGST), SJALOT, KNOFLAOK, BOSUIEN (LENTE-UI), NIET-VERHARDE PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN EN TIJDELIJK ONBETEELDE LANDBOUWGRONDEN

HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLÉES EN CÉRÉALES D'HIVER ET DE PRINTEMPS, PRAIRIES, RAY-GRASS, GAZONS ET PELOUSES, TERRAINS DE GOLF, MAÏS, MAÏS DOUX, OIGNONS (RÉCOLTE SEC), ÉCHALOTE, AIL, OIGNONS DE PRINTEMPS, TERRAINS MEUBLES, NON CULTIVÉS EN PERMANENCE ET TERRES AGRICOLES EN INTERCULTURE

Bevat: 480 g/L fluroxypyr-meptyl (48.0%) (=333 g/L fluroxypyr (33.3%), EC – emulgeerbaar concentrat

Contient: 480 g/L fluroxypyr-meptyl (48.0%) (=333 g/L fluroxypyr (33.3%), EC – concentré émulsionnable

Erkenningnummer / Numéro d'agrément : L0260P/B
Numéro d'agrément : L02005-208

Partijnummer : zie op de bus / N° de lot : voir sur le flacon
Product bestemd voor beroepsgebruik

Produit destiné à un usage professionnel
TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

Toelatingshouder:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D
4611 BB Bergen Op Zoom
Nederland
Website: www.corteva.be

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS :

070/245.245

POUR LE G.-D. DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500

UFI: 75X4-20W7-V00R-X3YT

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG



GHS07

GHS09

GEVARENAANDUIDINGEN

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

- P261 Inademing van damp en sputinevel vermijden.
- P280 Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P391 Gelekte/gemorst stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER

- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Provoque une grave irritation oculaire.
- Peut irriter les voies respiratoires
- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- EVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LES BRUMES DE POLYÉRISATION.
- Porter des gants de protection, de vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et savon.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- Recueillir le produit répandu.

INFORMATION ADDITIONNELLES

- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFARENHINWEISE

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verursacht schwere Augenreizung
- Kann die Atemwege reizen.

- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISEN

- Einatmen von Nebel und Dampf vermeiden.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen.

- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

- Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen.

SONSTIGEANGABEN

- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Artwork Free area for
in-house print of
2D data matrix code

LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

WERKINGSPECTRUM

Zeer gevoelige éénjarige breedbladigen

hennepnetel

kleefkruid

muur

veelknopigen

vergeet-me-nietje

zwarte nachtschade

Zeer gevoelige meerjarige breedbladigen

akkerwinde

haagwinde

zuring (jonge rozetten)

aardappelopslag

Ongevoelig

bereklaauw

boterbloemen

distels

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed
on the front page)

GEBRUIKSAANWIJZING

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten. Gelet op de grote gevoelighed van bepaalde gewassen voor dit product moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelt(en).

1 - ERKENDE TEELTEN

- Gazonen en grasvelden, golfterreinen (open lucht).
- Grasland-weiland, raaigras (open lucht).
- Mais, suikermais (open lucht).
- Niet verharde permanent onbeteelde terreinen.
- Prei (open lucht)
- Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.
- Uien (drooggeoogste), sjalot, knoflook, bosuien (lente-ui) (open lucht).
- Winter- en zomergranen : tarwe, gerst, triticale, spelten, rogge, haver (open lucht).

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

2-1 IN TARWE, GERST, TRITICALE, SPELT, ROGGE, HAVER (open lucht)

STADIUM

Ter bestrijding van de gevoelige, tweeaardlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende (*broadleaved plants*) (zie werkingspectrum), 1 toepassing, vanaf begin uitstoeing – eerste spruit zichtbaar tot 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop (BBCH 21 tot 32). In wintergranen: toepassing in het voorjaar.

DOSIS

Bij afzonderlijke toepassing: 0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

In menging met een product ter bestrijding van kleefkruid of met een vloeibare stikstof meststof worden de doses gehalveerd.

2-2 IN GRASLAND-WEILAND EN RAAIGRAS (open lucht)

STADIUM

Ter bestrijding van de gevoelige, éénjarige tweeaardlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*) (zie werkingspectrum), 1 toepassing van maart tot september.

DOSIS

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

Opmerking

Vlinderbloemigen zoals klaver worden eveneens bestreden. Bij het gebruik van herbiciden op basis van fytohormonen in grasland-weiland is het noodzakelijk de dieren vooraf te verwijderen en de gestelde veiligheidstermijn te respecteren vooraleer de dieren opnieuw de weide te laten begrazen.

2-3 IN GAZONS en GRASVELDEN, GOLFTERREINEN (open lucht)

STADIUM

Ter bestrijding van de gevoelige, éénjarige tweeaardlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*) (zie werkingspectrum), 1 toepassing van maart tot september.

DOSIS

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

Opmerking

Vlinderbloemigen zoals klaver worden eveneens bestreden.

2-4 IN NIET VERHARDE PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN EN TIJDDELIJK ONBETEELDE LANDBOUWGRONDEN

STADIUM

Ter bestrijding van de gevoelige, éénjarige tweeaardlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*) (zie werkingspectrum).

Behandelen tijdens de actieve groei van de onkruiden, 1 toepassing van maart tot september.

DOSIS

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

2-5 IN MAÏS EN SUIKERMAÏS (open lucht)

STADIUM

Ter bestrijding van akkerwinde en haagwinde (*Convolvulus arvensis/Convolvulus sepium*). Het product wordt toegepast in na-opkomst tegen voldoende ontwikkelde winde, 1 toepassing. Mais: Stadium 2 bladeren ontbouwen tot stadium 6 bladeren ontvouwen (BBCH 12 tot 16), volleldstoepassing op afgeharde mais. Mais en suikermaïs: Stadium 30 cm – 1 m hoog, toepassing met afschermkap tussen de rijen.

DOSIS

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

Opmerking

Bij temperaturen beneden 15°C is het aangeraden een uitvloei toe te voegen. STARANE™ FORTE kan een lichte & tijdelijke groei remming van de mais veroorzaken. Dit heeft geen impact op opbrengst en kwaliteit van de mais.

2-6 IN UIEN (DROOGGEOOGSTE), SJALOT, KNOFLOOK, BOSUIEN (LENTE-UI) (open lucht)

STADIUM

Ter bestrijding van gevoelige, tweeaardlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende (*broadleaved plants*) (zie werkingspectrum). Toepassing na-opkomst, stadium eerste blad (> 3 cm) zichtbaar tot stadium vijfde blad (> 3 cm) zichtbaar (BBCH 11 tot BBCH 15).

DOSIS

0,3 L STARANE™ FORTE /ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

2-7 IN PREI (open lucht)

STADIUM

Ter bestrijding van gevoelige, tweeaardlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende) (*Broadleaved plants*) (zie werkingspectrum). Toepassing na-opkomst, stadium 2^{de} blad (> 3cm) zichtbaar tot 8^{de} blad (> 3cm) zichtbaar (BBCH 12 tot BBCH 18).

DOSIS

0,18 L/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt). 1 toepassing. Maximaal 0,3 L/ha, gefractioneerd met maximum 0,18 L/ha per toepassing, en met minimum 5 dagen interval tussen 2 toepassingen.

Corteva™Agriscience is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij het gebruik van STARANE™ FORTE in prei.

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

25°C : maximum temperatuur om te sputten.

STARANE™ FORTE sputten bij hoge luchtvochtigheid.

8°C : minimum temperatuur om te sputten.

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.

Niet sputten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds sputten.



Einde van de behandeling ← 3 uren → regen



4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Om in het water levende organismen te beschermen dient een bufferzone van 1 m met klassieke techniek gerespecteerd te worden.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

5 - VEILIGHEIDSTERMIJN

Voor de toepassing in grasland-weiland en raigras: 7 dagen voor het maaien, het inkulen of het beweiden.

6 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het sputtoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van STARANE™ FORTE, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde sputtoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle sputtapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

7 - OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPa1 Om resistenteïnbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 4.
SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputteloëstof is opgedroogd.
SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

8 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

9 - EERSTE HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.
Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.
Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Spoel WEG van het niet-aangestarte oog.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):

+32 3 575 0330.

AANSPRAKELIJKHED

Corteva™Agriscience is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van het insecticide STARANE™ FORTE aangezien deze buiten zijn controle liggen. Corteva™Agriscience garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITE

Très sensibles: dicotylées annuelles

gaillet gratteron
galéopsis
morelle noire
mouron des oiseaux
myosotis
renouées

Très sensibles: dicotylées pérennes

liseron des champs
liseron des haies
rumex jeune
repousses de pommes de terre
Résistantes

berce
renoncule acré
chardon, laîteron

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Etant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes.

1 - CULTURES AGREES

- Céréales d'hiver et de printemps : froment, orge, avoine, épeautre, seigle, triticale (plein air).
- Gazon et pelouses, terrains de golf (plein air).
- Maïs, maïs doux (plein air).
- Oignons (récolté sec), ail, oignons de printemps, échalote (plein air).
- Poireau (plein air)
- Prairies, ray-grass (plein air).
- Terrains meubles, non cultivés en permanence.
- Terres agricoles en interculture.

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

2-1 EN CÉRÉALES D'HIVER & DE PRINTEMPS: FROMENT, ORGE, AVOINE, ÉPEAUTRE, SEIGLE, TRITICALE (plein air)

STADE

Pour lutter contre les dicotylées sensibles (*broadleaved plants*) (voir spectre d'activité), 1 application. STADES AGREES : début tallage jusqu'au deuxième nœud (BBCH 21-32). En céréales d'hiver : application en printemps.

DOSE

Traiter seul : 0,54 L STARANE™ FORTE /ha.
Pulvériser avec l'engrais azoté liquide (pré-empâtage nécessaire) : 0,27 L STARANE™ FORTE /ha dans l'engrais azoté liquide.

2-2 EN PRAIRIES ET RAY-GRASS (plein air)

STADE

Pour lutter contre les dicotylées annuelles sensibles (*Dicotyledonae (annual)*) (voir spectre d'activité), 1 application de mars à septembre.

DOSE

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

Remarque

STARANE™ FORTE détruit le trèfle. Lorsqu'une phytohormone est utilisée sur une prairie il est obligatoire de pulvériser sans la présence d'animaux ruminants et de respecter scrupuleusement le délai de quarantaine avant de laisser pâture.

2-3 EN GAZONS ET PELOUSES, TERRAINS DE GOLF (plein air)

STADE

Pour lutter contre les dicotylées annuelles sensibles (*Dicotyledonae (annual)*) (voir spectre d'activité), 1 application de mars à septembre.

DOSE

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

Remarque

STARANE™ FORTE détruit le trèfle.

2-4 EN TERRAINS MEUBLES, NON CULTIVÉS EN PERMANENCE ET TERRES AGRICOLES EN INTERCULTURE (plein air)

STADE

Pour lutter contre les dicotylées annuelles sensibles (*Dicotyledonae (annual)*) (voir spectre d'activité). Pulvériser pendant la pleine croissance des adventices, 1 application de mars à septembre.

DOSE

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

2-5 EN MAÏS ET MAÏS DOUX (plein air)

STADE

Pour lutter contre le lisuron des champs et le lisuron des haies. Application en post-émergence sur des lisurons suffisamment développés, 1 application. Maïs : Stade 2 à 6 feuilles du maïs (BBCH 12 à 16) pour un traitement en plein champ sur une végétation endurcie. Maïs et maïs doux : Stade 30 cm à 1 m pour un traitement entre les lignes avec une cache de protection.

DOSE

0,54 L STARANE™ FORTE /ha.

Si la température est inférieure à 15°C, ajouter un mouillant. STARANE™ FORTE peut provoquer une légère inhibition temporaire de la croissance du maïs. Ceci n'a pas d'impact sur le rendement et la qualité du maïs.

2-6 EN OIGNONS (RECOLTE SEC), ÉCHALOTE, AIL, OIGNONS DE PRINTEMPS (plein air)

STADE

Pour lutter contre les dicotylées annuelles et vivaces sensibles (voir spectre d'activité). Application en post-émergence, au stade 1 à 5 feuilles (BBCH 11 à BBCH 15).

DOSE

0,3 L STARANE™ FORTE /ha, éventuellement fractionné, max. 0,3 L STARANE™ FORTE/ha/culture.

2-7 EN POIREAU (plein air)

STADE

Pour lutter contre les dicotylées annuelles et vivaces sensibles (voir spectre d'activité). Application en post-émergence, au stade 2^{ème} feuille (> 3cm) visible à 8^{ème} feuille (>3cm) visible (BBCH 12 à BBCH 18).

DOSE

0,3 L STARANE™ FORTE /ha, éventuellement fractionné avec un maximum de 0,18 L par application et un intervalle de minimum 5 jours.

Corteva™ Agriscience n'est pas responsable pour les dommages occasionnés après l'usage de STARANE™ FORTE en poireau.

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

25°C : température maximale d'utilisation.

Pulvériser STARANE™ FORTE par hygrométrie élevée.

8°C : température minimale d'utilisation.

La prise de température se fait à l'ombre juste avant de pulvériser.

Par temps chaud, traiter le soir. Ne pas traiter par vent du nord ou d'est.



Fin du traitement

← 3 heures →



pluie

4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone de tampon de 1 m avec technique classique.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

5 - DELAI AVANT RECOLTE

Pour l'application en prairies et en ray-grass : 7 jours avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage.

6 - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de STARANE™ FORTE afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyeur de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyeur utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

7 - AUTRES RECOMMANDATIONS

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action des substance active de ce produit est 4.

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant les bras et les jambes (si

aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application de produits phytopharmaceutiques.

8 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

9 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique), **(+352) 8002 5500** (pour le G.-D. du Luxembourg) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Corteva™Agriscience n'est pas responsable des risques de stockage, de la manipulation ou de l'efficacité de l'insecticide STARANE™ FORTE puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Corteva™Agriscience garantit exclusivement la composition et le contrôle de la qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

SPo Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkts mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts ist 4.

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** oder SGS (Deutsch): **+49 40 30101 575**