



Broadway™

HERBICIDE

GROUP 2 HERBICIDE

HERBICIDE TEGEN EENJARIGE GRASSEN EN BREEDBLADIGE ONKRUIDEN IN WINTERGRANEN
HERBICIDE CONTRE LES GRAMINEES ANNUELLES ET DICOOTYLEDÉS EN CÉRÉALES D'HIVER

Bevat: 68 g/kg pyroxsulam + 23 g/kg florasulam + 68 g/kg cloquintocet-mexyl

WG – water dispergeerbaar granulaat

Contient : 68 g/kg pyroxsulam + 23 g/kg florasulam + 68 g/kg cloquintocet-mexyl

WG – granulés à disperser dans l'eau

Erkenningnummer / Numéro d'agrément : 10689P/B

Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder: Corteva Agriscience Netherlands B.V.

Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom - Nederland

Tel: 0031 164 444 000 - Website: www.corteva.be

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTI-POISONS 070/245.245

Partijnummer: zie op de bus / No de lot : voir sur le flacon

TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

UFI: EVR3-Y0XA-A00D-3QGH



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

GHS09

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280 Beschermdende handschoenen dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 Bevat cloquintocet-mexyl en pyroxsulam. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER

Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

Porter des gants de protection.

Recueillir le produit répandu.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Contient du cloquintocet-mexyl et du pyroxsulam. Peut produire une réaction allergique.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFARENHINWEISE

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISEN

Schutzhandschuhe tragen.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

SONSTIGE ANGABEN

Enthalt cloquintocet-mexyl und pyroxsulam. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

LEGE VERPAKKING EN SPUITOERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleegde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om sputtoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu



WERKINGSSPECTRUM

Zeer gevoelige éénjarige grassen

Duist
Raai-gras
Wilde haver
Windhalm
Dravik (tot begin uitstoeling)
Straatgras (tot begin uitstoeling)

Zeer gevoelige éénjarige breedbladigen

Akkerviooltje
Ereprijssoorten
Kamille
Klaproos
Kleefkruid
Kruisbloemigen
Muur
Ooievaarsbek
Schermbloemigen

Weinig gevoelige en ongevoelige onkruiden

Dovenetel
Duivenkervel

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Mengingen

Bij het maken van mengingen eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers toevoegen aan de tank.

BROADWAY™ niet toepassen met een vloeibare stikstofmeststof. Een interval van 7 dagen respecteren tussen een toepassing van het product en het aanbrengen van een vloeibare stikstofbron.

1 - ERKENDE TEELTEN

Wintergranen: tarwe, rogge, triticale en spelt (open lucht en zaadproductie)

Sierplanten (open lucht)

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Toepassingstechniek: bespuiting.

2-1 IN WINTERGRANEN : TARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT (open lucht en zaadproductie)

BROADWAY™ kan ingezet worden ter bestrijding van duist (*Alopecurus myosuroides*), raaigras (*Lolium spp.*), straatgras (*Poa annua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (zie werkingsspectrum).

STADIUM

Toepassen in de lente vanaf het stadium begin uitstroeling tot eerste knoop (BBCH 21-31). Voor een optimaal resultaat wordt best behandeld aan het einde van de winter (februari – maart). De latere toepassingen kunnen onvoldoende werkzaamheid vertonen. Maximaal 1 toepassing/teelt.

DOSIS

220 g/ha, in menging met een toevoegingsstof op basis van geësterde koolzaadolie aan een dosis van 1 L/ha.

BROADWAY™ niet afzonderlijk gebruiken op populaties van duist waarvan geweten is dat ze moeilijk te bestrijden zijn. In dit geval wordt aangeraden BROADWAY™ toe te passen in menging met een ander ALS-grassenmiddel.

Op resistente duist moet steeds de volle dosis van elk middel worden toegediend.

2-2 IN SIERPLANTEN (open lucht)

Alléén voor België

BROADWAY™ kan ingezet worden ter bestrijding van duist (*Alopecurus myosuroides*), raaigras (*Lolium spp.*), straatgras (*Poa annua*), windhalm (*Apera spica-venti*) en eenjarige tweezadlobbige onkruiden (zie werkingsspectrum).

STADIUM

Toepassen in het voorjaar. Plaatselijke behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken.

BROADWAY™ niet afzonderlijk gebruiken op populaties van duist waarvan geweten is dat ze moeilijk te bestrijden zijn. In dit geval wordt aangeraden BROADWAY™ toe te passen in menging met een ander grassenmiddel. Op resistente duist moet steeds de volle dosis van elk middel worden toegediend.

DOSIS

220 g/ha, in menging met een toevoegingsstof op basis van geësterde koolzaadolie aan een dosis van 1 L/ha.

Maximaal 1 toepassing/12 maanden.

De gevoeligheid van sierplanten kan variëren naargelang de soort en de variëteit. Doe daarom steeds voorafgaandelijk een proef op een kleine oppervlakte. Corteva™ Agriscience is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij het gebruik van BROADWAY™ in sierplanten.

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Niet sputten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds sputten.



20°C : maximum temperatuur om te sputten.

5°C : minimum temperatuur om te sputten.

BROADWAY™ dient te worden toegepast op een droog (lichte dauw) en gezond gewas. Als het middel wordt toegepast op gewassen welke in een slechte conditie verkeren kan vergeling en/of groeireductie optreden.



Einde behandeling



1 uur



regen

4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Respecteer een minimale bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Het overwaaien van sputnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of planten gewassen moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind.

5 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN EN VERVANGGEWASSEN

Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. De volg- of vervanggewassen die geteeld kunnen worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.

In geval van gewasmislukking kunnen volgende gewassen vanaf 6 weken na de toepassing heringezaaid worden: graangewassen, maïs en raaigras.

Geen bieten, aardappelen, bonen, cichorei, spinazie, rapen of uien planten als vervanggewas.

Volgende teelten zijn mogelijk binnen een normale rotatie: tarwe, gerst, triticale, maïs, haver, erwten, bonen, raaigras, bieten, aardappelen, planten van koolgewassen en koolzaad.

6 - RESISTENTIEMANAGEMENT

Pyroxsulam en florasulam zijn herbicides met een ALS inhibitor (acetolactaat synthase inhibitor) werkingsmechanisme ingedeeld als HRAC 2 (of B).

Wanneer herbiciden met dezelfde werkingswijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten onkruiden te bestrijden, in hetzelfde veld, kunnen bepaalde resistente biotypes, die van nature aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler de toepassing van BROADWAY™ afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) met een verschillende werkingswijze.

7 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het sputtoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van BROADWAY™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde sputtoestel worden behandeld. De meeste cultuurgewassen zijn zeer gevoelig!!!

- Na gebruik moet alle sputtoestel zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een hiervoor geschikt tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Herhaal deze procedure nog eenmaal.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

8 - OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 Om resistantieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 2.
- SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

9 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

10 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330**.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITE

Graminées annuelles très sensibles

Folle avoine
Jouet du vent
Ray-grass
Vulpin
Pâturin (jusqu'au début tallage)
Brome (jusqu'au début tallage)

Dicotylées annuelles très sensibles

Coquelicot
Crucifères
Gaillet gratteron
Geranium
Matricaire
Mouron
Ombellifères
Pensée
Véroniques

Mauvaises herbes peu sensibles et insensibles

Fumeterre
Lamier

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Mélanges

Lors de la préparation des mélanges, introduire d'abord des formulations solides, puis des formulations liquides et enfin ajouter des agents mouillants dans la cuve.

Ne pas appliquer BROADWAY™ avec un engrais azoté liquide. Respecter un intervalle de 7 jours entre l'application du produit et l'apport d'engrais azoté liquide.

1 - CULTURES AGREES

Céréales d'hiver : froment, seigle, triticale et épeautre (plein air et production de semences).

Plantes ornementales (plein air).

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Méthode d'application : pulvérisation.

2-1 EN CEREALES D'HIVER : FROMENT, SEIGLE, TRITICALE ET EPEAUTRE (plein air et production de semences)

BROADWAY™ s'utilisé pour combattre vulpin (*Alopecurus myosuroides*), ray-gras (*Lolium spp.*), pâturin (*Poa annua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*) en dicotylées annuelles (voir spectre d'activité).

STADE

S'utilise au printemps à partir du stade début tallage jusqu'au premier nœud (BBCH 21-31).

Pour obtenir un résultat optimal, il faut de préférence traiter en sortie d'hiver (février – mars). Des applications plus tardives peuvent montrer une efficacité insuffisante.

Maximum 1 application/culture.

DOSE

220 g/ha, en mélange avec une huile de colza estérifiée agréée à cet effet à la dose de 1 L/ha.

Ne pas utiliser BROADWAY™ seul en cas de populations connues de vulpins difficiles à contrôler. Dans ce cas nous conseillons d'appliquer BROADWAY™ en mélange avec un autre herbicide antigraminées appartenant à une famille similaire du type ALS.

Sur vulpin résistant, la dose la plus élevée de chaque produit doit être utilisée.

2-2 EN PLANTES ORNEMENTALES (plein air)

Seulement pour La Belgique

BROADWAY™ s'utilise pour combattre vulpin (*Alopecurus myosuroides*), ray-gras (*Lolium spp.*), pâturin (*Poa annua*), jouet du vent (*Apera spica-venti*) et dicotylées annuelles (voir spectre d'activité).

STADE

S'utilise au printemps. Traitement localisé entre les lignes **sans toucher la culture**.

Ne pas utiliser BROADWAY™ seul en cas de populations connues de vulpins difficiles à contrôler. Dans ce cas nous conseillons d'appliquer BROADWAY™ en mélange avec un autre herbicide antigraminées. Sur vulpin résistant, la dose la plus élevée de chaque produit doit être utilisée.

DOSE

220 g/ha, en mélange avec une huile de colza estérifiée agréée à cet effet à la dose de 1 L/ha.

Maximum 1 application/12 mois.

La sensibilité des plantes ornementales peut varier selon l'espèce et la variété. Toujours réaliser un essai au préalable sur une petite surface pour connaître la sensibilité de l'espèce. Corteva™ Agriscience n'est pas responsable pour les dommages occasionnés après l'usage de BROADWAY™ en plantes ornementales.

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

Ne pas appliquer par vent du nord ou de l'est. Par temps chaud appliquer de préférence le soir.



20°C : température maximum d'utilisation.

5°C : température minimum d'utilisation.

BROADWAY™ s'applique sur une végétation sèche (légère rosée) et saine. Si le produit est appliqué sur une culture stressée, des symptômes de jaunissement et/ou des freinages de croissance peuvent apparaître temporairement.



Fin du traitement

← 1 heure →



pluie

4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Zone tampon minimale de 5 m par rapport aux eaux de surface, avec technique classique.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

Etant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes. Toute dérive de bouillie de pulvérisation, vers des eaux de surface (mares ou étangs) ou une culture voisine présente ou à planter, doit être évitée. Veuillez de ce fait pulvériser par temps calme avec peu de vent.

5 - AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES SUIVANTES ET LES CULTURES DE REMPLACEMENT

Des dommages aux cultures suivantes ou de remplacement ne peuvent pas être exclus. Les cultures suivantes ou de remplacement qui peuvent être cultivées sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation.

En cas d'échec de la culture, il est de nouveau possible de semer les cultures de remplacement à partir de 6 semaines après l'application : céréales, maïs et ray-grass.

Ne pas planter de betteraves, pommes de terre, haricots, chicorée, épinard, navet et oignons comme culture de remplacement.

Les cultures suivantes sont possibles dans une rotation normale : froment, orge, triticale, maïs, avoine, pois, haricots, ray-grass, betteraves, pommes de terre, culture de choux repiqués et colza.

6 - PREVENTION DE LA RESISTANCE

Pyroxsulam et florasulam sont des herbicides à mode d'action ALS inhibiteur (acétolactate synthase inhibiteur) classifié comme HRAC 2 (ou B).

Lorsque des herbicides ayant le même mode d'action sont utilisés consécutivement pendant plusieurs années pour lutter contre les mêmes espèces d'adventices sur la même parcelle, des biotypes résistants, naturellement présents dans la population, peuvent survivre et devenir résistants dans cette parcelle.

Pour éviter que le phénomène ci-dessus se produise très rapidement, il est important que l'utilisateur mélange ou alterne BROADWAY™ avec des produits ou des mélanges de produits à modes d'action différent.

7 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de BROADWAY™, afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur. La plupart des cultures sont très sensibles !!!

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyant de cuve adapté et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyant utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Répéter la procédure encore 1 fois.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

8 - AUTRES RECOMMANDATIONS

- SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 2.
- SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Porter toujours un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

9 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

10 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise der Wirkstoff dieses Produkt ist 2.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen).
- SPo Behandelte Grundstücke/Flächen nicht wieder betreten, bevor die Spritzlösung getrocknet ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an der Giftnotrufzentrale
070 / 245.245 oder SGS (Deutsch): **+49 40 30101 575**.

