



Bestrijding van zomeronkruiden in grasland

Meerjarige onkruiden, veelal lastig te bestrijden

Zuring, distels en schermbloemigen zijn vaak voorkomende meerjarige onkruiden in grasland.

De zomer is de ideale periode om deze meerjarige onkruiden te bestrijden.

Het resultaat van de onkruidbestrijding hangt vooral af van het stadium van het onkruid en van de productkeuze.

Het ideale stadium om te behandelen blijft het rozetstadium, onkruiden in volle groei.

Onkruiden in bloei of uitgebloeid hebben een zwakke sapstroom die een mindere opname geeft van het herbicide.

Het is daarom aangeraden dergelijke ontwikkelde onkruiden eerste te maaien en daarna de hergroei te gaan behandelen.

Op zuring

Beste keuze

BOFORT 2 L/ha of **DOXSTAR/PASTOR** 2 L/ha

BOFORT bevat fluroxypyr+aminopyralid die een diepgaande afdoding geeft van alle soorten zuring. **BOFORT** biedt een oplossing op lange termijn, tot 3 jaar afhankelijk van de bezetting. **BOFORT** kan enkel worden toegepast in permanente weiden zonder aansluitende stal.

DOXSTAR/PASTOR combineert de efficiëntie van fluroxypyr met de duurwerking van triclopyr op grote zuringplanten en versterkt het spectrum op grote brandnetel, schermbloemigen en verhoutte planten.

Tabel stadium ZURING

Te vroeg	Optimaal stadium	Te laat
		
Te weinig blad	Stadium rozet	Stadium bloei




Op distels

Beste keuze

BOFORT 2 L/ha of **PREVAIL/THISTLEX** 1 L/ha of **TREVISTAR** 1.5 L/ha

BOFORT/THISTLEX combineren een hoge dosis **MATRIGON** met triclopyr om ook bij distels de duurwerking te versterken en geven zodoende een grondig resultaat. **BOFORT** geldt als één van de middelen bij uitstek voor de bestrijding van distels. Net zoals op zuring biedt **BOFORT** op distels op lange termijn de beste oplossing! **TREVISTAR** combineert de sterke punten van fluroxypyr+florasulam+clopyralid voor een goede bestrijding van éénjarige en distels. De combinatie met **DOXSTAR** laat toe om daarnaast ook ontwikkelde/meerjarige ridderzuring, krulzuring en grote brandnetel aan te pakken.

Tabel stadium DISTELS

Te vroeg	Optimaal stadium	Te laat
		
Te weinig blad	Stadium rozet	Stadium bloei

Op fluitekruid en andere schermbloemigen

Beste keuze

ZYPAR/MATTERA/RENITAR 1 L/ha

ZYPAR/MATTERA/RENITAR zijn nieuwe oplossingen op basis van **ARYLEX Active** en florasulam voor een efficiënte bestrijding van éénjarige onkruiden en schermbloemigen zoals fluitekruid. Op bereklauw en zevenblad is een combinatie aangeraden met **DOXSTAR/PASTOR** om een goed resultaat te hebben. De "passe-partout" **BOFIX** 4 L/ha wordt gekenmerkt door zijn breed werkingspectrum. **BOFIX** wordt in menging gebruikt om een goede afdoding van meerjarigen te bekomen.

Tabel stadium FLUITEKRUID en SCHERMBLOEMIGEN

Te vroeg	Optimaal stadium	Te laat
		
Te weinig blad	Stadium rozet	Stadium bloei

Onkruidspectrum tegen meerjarige onkruiden in stadium rozet

	BOFORT	DOXSTAR/PASTOR	TREVISTAR	DOXSTAR+PREVAIL /THISTLEX	DOXSTAR+ZYPAR
DOSIS in L/ha	2 L	2 L	1.5 L	1+1 L	1.5+1 L
Akkerboterbloem	MS	S	SS	S	S
Akkerdistel	SS	MS	SS	SS	MS
Akkerwinde	S	S	MS	S	S
Bereklaaw	R	MS	MS	MS	S
Braam	S	SS	R	SS	SS
Fluitekruid	R	MS	MR	MS	SS
Grote brandnetel	SS	SS	MS	SS	SS
Haagwinde	S	S	SS	S	SS
Jakobskruiskruid	SS	R	S	MS	R
Japanse duizendknoop	S	SS	R	SS	SS
Klaver	SS	SS	SS	SS	SS
Kruipende boterbloem	MS	MS	SS	MS	SS
Krulzuring	SS	SS	R	SS	SS
Madeliefje	R	SS	R	SS	SS
Paardebloem	SS	S	SS	SS	S
Ridderzuring	SS	SS	MS	SS	SS
Scherpe boterbloem	MS	MS	MR	MS	MS
Speerdistel	SS	MS	S	S	MS
Weegbree	S	MS	MS	MS	SS
Witte dovenetel	R	MS	R	MS	S

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

MR Efficiëntie 50-60%

R Efficiëntie <50%

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
 © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 CORTEVA