



## Langdurige bescherming tegen Phytophthora

**FUNGICIDE**

**Zorvec Enicade<sup>®</sup>**

**Zorvec Endavia<sup>™</sup>**

# ZORVEC ENICADE®: UNIEKE WERKWIJZE VOOR EEN PERFORMANTE BESTRIJDING

## ZORVEC ENICADE®

... toont een superieure efficiëntie op zowel blad- als stengelphytophthora.

... wordt toegepast aan 150 ml/ha + partner, vier behandelingen per teeltseizoen.

... behoort tot een chemische familie die inwerkt op een nieuwe bindingsplaats (OSBP) die de vorming van celmembranen verhindert.

... kent geen kruisresistentie met bestaande fungicides.

... bestrijdt alle Phytophthora-stammen, ook EU-36 en EU-37, de meest voorkomende stammen in België.

... beschermt langer waardoor het interval tussen behandelingen kan worden verlengd: klassiek interval + 3-4 dagen.

... is een translaminair fungicide met een sterke systemiciteit die ook de nieuwe bladeren beschermt.

... wordt toegepast tijdens de snelle groeifase om optimaal te profiteren van zijn opwaarste systemiciteit.

... is heel snel regenvast, binnen de 20 minuten na toepassing.

... is een unisite-fungicide.

Om de vorming van resistentie te vermijden, wordt Zorvec steeds preventief ingezet en in combinatie met een partner met een andere werkwijze zoals Gachinko, Reboot, Versilus.



## EIGENSCHAPPEN VAN ZORVEC

### REGENVAST



NA 20  
MINUTEN

Zorvec wordt zeer snel opgenomen in de waslaag van de plant en is daarmee het snelst regenvaste Phytophthoramiddel.

### BESCHERMT

nieuwe groei



Zorvec is een translaminair fungicide met een sterke systemiciteit die ook de nieuwe bladeren beschermt.

### 3 - 4 DAGEN LANGERE



### BESCHERMING

Zorvec beschermt langer, waardoor het interval tussen behandelingen kan worden verlengd: klassiek interval + 3-4 dagen.



## 'Efficiëntie en gemak aan een kleine dosis...'

### ZORVEC ENDAVIA™

- ... is de eerste kant-en-klaar formulering van Zorvec Enicade.
- ... bevat Zorvec 30 g/l + Bentiavalicarb 70 g/l.
- ... combineert de eigenschappen van Zorvec en deze van bentiavalicarb, twee verschillende werkwijzes voor een effectief resistentiemanagement.
- ... wordt toegepast aan 0,4 L/ha, 4 toepassingen per teeltseizoen.
- ... beschermt 3-4 dagen langer dan de standaardproducten.
- ... beschikt over een geoptimaliseerde OD-formulering die de efficiëntie verbetert.
- ... is mengbaar met herbiciden en insecticiden.

### REFERENTIES IN DE MARKT OP PHYTOPHTHORA INFESTANS

Euroblight is een onafhankelijk Europees netwerk van wetenschappers en deskundigen die de fungiciden technisch gaan beoordelen.

Zorvec Enicade en Zorvec Endavia tonen beiden een excellente werking op zowel blad- als stengelphytophthora en beschermen daarnaast ook de nieuwe bladeren.

Deze twee middelen kennen een zeer goede regenvastheid wat de nodige flexibiliteit geeft in het geval van wisselende weersomstandigheden.

### Euroblight: technische beoordeling van Zorvec Enicade en Endavia

	Bescherming van het blad (schaal 2-5)	Bescherming van de nieuwe groei	Bescherming van de stengel	Preventieve werking	Regenvastheid
Zorvec Enicade®	4,9*	++(+)	++(+)	+++	+++
Zorvec Endavia™	4,9	++(+)	++(+)	+++	+++

Bron: Euroblight ([www.euroblight.net](http://www.euroblight.net)) \* Zorvec Enicade® + partner



## EXCELLENTE WERKING OP PHYTOPHTHORA



PLAAG BLADEREN



PLAAG STENGEL



ONBEHANDELD



ZORVEC ENICADE® & ENDAVIA™  
BLOK VAN 3 ELKE 10 DAGEN


## TOEPASSING ZORVEC ENICADE® & ENDAVIA™

### POSITIONERING AAN HET BEGIN VAN DE SNELLE LOOFGROEIFASE

De snelle loofgroeifase is de meest kritieke periode voor Phytophthora. De systemiciteit van Zorvec laat een zeer goede bescherming toe van het nieuwe blad bij deze snelle ontwikkeling van veel bladmassa.

Deze periode is ook gevaarlijk voor het verschijnen van stengelphytophthora. Zorvec aan het begin van het seizoen beschermt ook tegen stengelphytophthora.

#### Aanbevolen schema:



Zorvec Enicade® + partner of Zorvec Endavia® worden toegepast in een blok van drie opeenvolgende bespuitingen vanaf de tweede of derde behandeling in functie van de ontwikkeling van het gewas. Het interval tussen de behandelingen varieert in functie van de Phytophthoradruk: interval standaardproducten + 3-4 dagen.

