



**Titus™** + **Vivolt™**

**Herbiciden**

**Vroeg na-opkomst herbicide  
in aardappelen**

**Tegen breedbladige onkruiden & grassen**



**CORTEVA™**  
agriscience

## Herbicide in de vroege na-opkomst

*De keuze aan correctieherbiciden is beperkt.*

**TITUS** is één van de weinige herbiciden toegelaten in de vroege na-opkomst.

**TITUS** bevat 25 % rimsulfuron (WG) en behoort tot de familie van de sulfonylurea (ALS), groep 2.

**TITUS** werkt hoofdzakelijk via bladopname en heeft geen nawerking. De eerste symptomen zijn zichtbaar 2-3 weken na de toepassing in functie van de weersomstandigheden.

Een toepassing in de ochtend is aangeraden. Een optimale efficiëntie wordt bekomen op jonge, groeiachtige onkruiden.

### Erkenning van TITUS

#### Herbicide in vroege na-opkomst

**Voor de bestrijding van:** éénjarige grassen en één- en meerjarige breedbladige onkruiden

**Aantal toepassingen:** 1 tot 2 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen

Herhaal een tweede behandeling met eenzelfde dosis in het geval van nieuwe kiemers

**Risicobeperkende maatregelen:** bufferzone van minimaal 1m t.o.v. oppervlaktewater

**Dosis TITUS** 40 g/ha + **VIVOLT** 100 mL/100 L oplossing per behandeling in vroege na-opkomst



Melganzevoet



Duivekervel



Kleefkruid



Zwaluw tong



Herik



Klein kruiskruid

## Hoe TITUS toepassen?

**TITUS** heeft een breed werkingsspectrum op grassen en één- of meerjarige breedbladige onkruiden.

Het is belangrijk om op jonge onkruiden te behandelen.

**TITUS** is inzetbaar in alle variëteiten van consumptie-aardappelen. Onder extreme omstandigheden kan er wel een tijdelijk effect op de bladeren worden waargenomen. Behandelingen in plantgoed worden afgeraden.

**TITUS** wordt gefractioneerd toegepast met producten op basis van metribuzine (op tolerante variëteiten).

De varietale gevoeligheid voor bepaalde herbiciden moet bekeken worden vóór de bespuiting.

**TITUS** is compatibel met fungiciden aan het begin van de groei.

### Bestrijding van melganzevoet

Onder droge omstandigheden is melganzevoet het moeilijkst te bestrijden onkruid. Behandel in een jong stadium (kiemlob – 2 bladeren), vroeg in de ochtend om een bestrijding van om en bij de 80% te halen.

*Bij toepassingen op grotere melganzevoet kunnen de resultaten minder goed zijn.*



Melkdistel



Dovenetel



Zwarte nachtschade



Kweek



Hanepoot



Straatgras



# Titus™

## De sterke punten

- Breed werkingsspectrum: ALS-gevoelige grassen, één- en meerjarige breedbladige onkruiden
- Mengbaar met andere herbiciden en fungiciden
- Kan in alle veiligheid in alle variëteiten van consumptie-aardappelen worden toegepast

*P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg <https://fytoweb.be/nl/toelatingen>*

*™ & © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2023 CORTEVA*