

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**

**ДЕЛЕГАТ 250 ВГ**

Инсектицид за контрол на неприятели по овощни култури и маслини.



**Внимание**

**Предупреждения за опасност:**

H317 Може да причини алергична кожна реакция

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

**Препоръки за безопасност:**

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/контейнера да се изхвърли съгласно приложимите разпоредби.

**Допълнително етикетиране:**

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. ( Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица с допълнение на 50% дюзи намаляващи отвяването до повърхностните води с цел опазване на водните организми при семкови и костилкови овощни видове.

SPe3Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до неземеделски земи с цел опазване на неприцелните членестоноги при семкови и костилкови овощни видове.

SPe8 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

**Притежател на разрешението:**

„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД, България

**Дистрибутор:**

„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД  
1766 София, Младост 4, БПС София,  
сграда 1А, ет. 1  
тел. + 359 2 4899160

**Дата на производство:** виж опаковката

**Партида №** Виж опаковката

**Нето опаковка:**

**Срок на годност – 3 години**

**Активно вещество:**

Спинеторам- 250 г/кг (25 %)

**Функция на ПРЗ – Инсектицид**

**Вид на формулацията – Вододиспергируеми гранули (ВГ)**

**Разрешен за употреба в Република България с Разрешение № 01525-ПРЗ/3-13.09.2021 г.**

**Категория на употреба: втора професионална**

**НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:**

Делегат 250 ВГ навлиза в насекомите основно при контакт и поглъщане. След навлизането, продуктът действа върху специфично невронно-рецепторно място в насекомото. Симптомите се появяват почти незабавно и в рамките на няколко часа насекомото загива. Делегат 250 ВГ не е системен инсектицид, но демонстрира трансламинарно движение.

**РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:**

**Продуктът да се прилага при спазване закона за пчеларството.**

**1. При ябълки и круши, за контрол на ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*), листозавивачки (*Pandemis sp.*), кръгломиниращ молец (*Leucoptera scitella*), миниращи молци (*Lithocolletis sp.*) и източен плодов червей (*Grapholita molesta*), в доза 30 г продукт /дка. Продуктът се прилага във фенофази от „размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване“ до фаза „беритбена зрелост“ (ВВСН 71 - 87).**

**Количество вода: 100- 120 л/дка**

Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на продукта в листата.

**2. При круши за контрол на крушови листни бълхи (*Psylla sp.*), в доза 30 г продукт /дка. Продуктът се прилага във фенофази от „размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване“ до фаза „беритбена зрелост“ (ВВСН 71 - 87).**

**Количество вода: 100- 120 л/дка**

Количеството вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на продукта в листата.

**3. При праскови, нектарини и кайсии за контрол на плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*), източен плодов червей (*Grapholita molesta*), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), в доза 30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)“ до „беритбена зрелост“ (ВВСН 69-87).**

**Количество вода: 100- 120 л/дка**

**4. При сливи и джанки за контрол на плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*), сливов плодов червей (*Cydia funebrana*), в доза 30 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази от „вторично окапване на завръза“ до „беритбена зрелост“ (ВВСН 73- 87).**

**Количество вода: 100- 120 л/дка**

Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на продукта в листата.

**5. При маслини** за контрол на **маслинов костилков пробивач** (*Prays oleae*), в доза 7,5- 10 г продукт/дка. Продуктът се прилага във фенофази ВВСН 61 -79.

**Количество вода:** 100- 150 л/дка

Следвайте инструкциите на националната система за предупреждение. Количеството вода трябва да отразява необходимостта от равномерно покриване и проникване на продукта в листата.

**Техника на приложение за всички употреби:** конвенционална наземна техника.

**Максимален брой приложения на година на култура:** 1.

**Карантинен срок (ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи, джанки) -** времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 7 дни.

**Карантинен срок (маслини) -** времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 21 дни.

#### **РАБОТА С ПРОДУКТА**

При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и гащеризон.

При повторно влизане в третираните площи, да се носи: защитни ръкавици и работно облекло.

Срок на изчакване преди повторно влизане в парцела: 48 часа

## **ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ**

**Вдишване:** Пострадалият да се изнесе на свеж въздух. Ако лицето не диша, да се повика бърза помощ или линейка, след което да се приложи изкуствено дишане; ако се използва метода "уста-в-уста", да се вземат мерки за защита на спасителя (маска и пр.). За съвет относно лечението,позвънете на контролния център за случаи на отравяне, или извикайте лекар.

**Контакт с кожата:** Съблечете замърсеното облекло. Кожата незабавно да се изплакне с обилно количество вода за период от 15-20 минути. За съвети по лечението се обърнете към центъра за помощ при отравяния или към лекар.

**Контакт с очите:** Задръжте очите отворени и бавно и внимателно промийте с вода в продължение на 15-20 минути. След първите 5 минути, да се отстранят контактните лещи, ако има такива, след което продължете с промиването на очите. За съвети по лечението се обърнете към център. На работното място да се осигури подходящо съоръжение за промиване на очите при спешни случаи.

**Поглъщане:** Никакво медицинско лечение не е необходимо при извънредни ситуации.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233

[poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg)

<http://www.pirogov.bg>

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

## **УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:**

При приготвянето на работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и и изсипете препоръчаната доза от Делегат 250 ВГ при включени бъркалки. След това допълнете при непрекъснато разбъркване, за да се осигури пълно смесване. Пръскането се извършва при непрекъснато разбъркване на разтвора до приключване на третирането. Използвайте само чиста вода за приготвяне на работния разтвор. Използвайте работния разтвор веднага след приготвянето му.

## **ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И РАБОТНОТО**

**ОБЛЕКЛО:** Цялото оборудване, което е използвано за приложение на Делегат 250 ВГ трябва да бъде почистено обилно с чиста вода веднага след употреба, до отстраняване на всички видими остатъци. Измийте резервоара на пръскачката и оборудването обилно с вода и течен детергент. Водата, използвана за изплакване трябва да се приложи върху културата, ако е възможно, в съответствие с добрата земеделска практика. Изпразнете опаковката, изплакнете я с устройство под налягане или трикратно ръчно. Като алтернатива, промивните води, съдържащи ниски нива на спинеторам може да бъдат предоставени на лицензиран изпълнител за обезвреждане на отпадъците. Не се изисква специфично защитно облекло при почистване на оборудването.

## **ФИТОТОКСИЧНОСТ:**

При приложение в съответствие с препоръките, дадени в етикета, не се очакват неблагоприятни ефекти или остатъци от продукта по листата или плодовете.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА:**

- Продуктът да се прилага в програма за третиране и да се редува с продукти с друго активно вещество и с различен начин на действие. При употреба на спинозад в програмата за третиране, максималният брой на приложенията на спинозини (спинозад и спинеторам) да се ограничи до 3 приложения на вегетационен сезон;
- Да се прилага в съответствие в подходящите фази на развитие на насекомите или съгласно системата за прогноза и сигнализация;
- Когато е възможно, да се използват алтернативни методи на интегрираната система за растителна защита (културални или биологични) за контрол на неприятелите;
- Да не се намалява дозата на приложение дори когато Делегат 250 ВГ се използва в смеси с други продукти.

### **СЪХРАНЯВАНЕ:**

Съхранявайте на хладно, сухо и добре проветриво място, в оригиналната опаковка. Да се пази от прекомерна топлина и студ. Да не се съхранява в близост до храна, напитки, храни за животни. При тези условия на продукта остава стабилен в продължение на 2 години.

### **УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ДЕПОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НЕГОВАТА ОПАКОВКА:**

Подходящи методи за обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Да не се използват отново празните опаковки. Празните опаковки не трябва да се използват за други цели. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба и да се изхвърлят в специални събирателни пунктове за рециклиране. Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък. Ненапълно изпразнените от съдържанието им опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.