

Matrigon™ 72

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadiet 50.

Må i sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål ikke anvendes senere end maj.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Førstehjælp:

Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.

273830 2212

Blank area for in-house print of
2D date matrix code



Matrigon™ 72

UKRUDTSMIDDEL

GROUP 4 (0) HERBICIDE

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisning se næste side.

Ukrudtsmiddel nr. 64-136

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Clopyralid 720 g/kg (72 % w/w).

(formuleret som clopyralid-olamine 949 g/kg (94,9 % w/w)).

Nettoindhold: 1 kg.

Midlet er et vandopløseligt granulat.

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, 1411 København K
Tlf. 45 28 08 00, www.corteva.dk**

™ Trademarks of Corteva Agriscience
and its affiliated companies



NETTOINDHOLD: 1 KG

BASE LABEL

BASE LABEL

273833 2212

Teknisk information

Matrigrøn 72 er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinter- og vårraps, sukkerroer, fodroer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.

Matrigrøn 72 bekæmper bl.a. kamille, snerlepileurt, svinemælk, gråbynke og tidsler.

Virkemåde

Matrigrøn 72 indeholder auxindanneren clopyralid, som primært optages gennem blade.

På følsoerne ukrudtsarter ses de første symptomer fra få dage efter behandling. I planten medfører clopyralid ukontrolleret vækst som resulterer i at planten kollapse. Den fulde effekt ses fra 3-4 uger efter behandling.

Klimaforhold ved anvendelse

Optimal effekt opnås ved behandling om morgenen når planterne er saftsprængte og i god vækst. Dagtemperaturen bør være over 15°C omkring behandlingstidspunktet.

Undgå at behandle hvis der i perioden omkring sprøjetidspunktet er udsigt til frost.

Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, næringsstofmangel og meget høje dagtemperaturer.

Doserings- og anvendelsesvejledning

Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.

Afgrøde	Tidspunkt	Dosering	Bemærkninger
Vinter- og vårraps	BBCH 31-50	110 g/ha	Tilsætning af olie anbefales. Vinterraps behandles senest i vækststadiet BBCH 50. På det tidspunkt er knoppen stadig omsluttet af blade.
Etablerede træ- og buskarter, gran- og ædelgranarter	Ukrudt 10-30 cm	165 g/ha	Kun som pletsprøjtning på max 20% af arealet.
Sukkerroer, fodroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål	Ukrudt 2-4 løvblade og ikke senere end maj	140 g/ha	Kun som rækkebehandling i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales.
		35 g/ha	Anvendes i blanding med andre ukrudtsmidler for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie anbefales.

Effektniveau

>90 % effekt	Gråbynke, alm. brandbæger, fliget brøndsel, haremad, kløver, vellugtende- og lugtlos kamille, mælkebøtte, kornblomst, gul okseøj, svinemælk og agertidsel
70-90 % effekt	Alm. rolleke, kortstråle, snerlepileurt, sort natskygge, vikke og vild gulero

Regnfasthed

Matrigrøn 72 er regnfast efter 6 timer.

Jordtype

Matrigrøn 72 kan anvendes på alle jordtyper.

Tankblandinger

Blanding med mikronæringsstoffer, som fx Solubor, frarådes af hensyn til risiko for udfældning af disse.

Matrigrøn 72 bør ikke blandes med Safari¹. Ved bekæmpelse af tidsler er det vigtigt, at tidslerne er i god vækst. Derfor bør der på 14 dage fra en behandling med Safari til der behandles med Matrigrøn 72 mod tidsler.

Omsåning

Ved omsåning kan der etableres korn, majs, raps og græs.

Efterfølgende afgrøde

Følgende afgrøder er følsoerne overfor Matrigrøn 72:

— kartoffel og andre arter af natskygge-familien

— ært, bønne, lupin og andre bælgplanter

— gulero og andre skærblomstre arter

— salat og andre kurvblomstre arter

Vækstmateriale fra en afgrøde, der er behandlet med Matrigrøn 72, som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følso afgrøde. Derfor bør der ikke etableres følso afgrøder, umiddelbart efter vækstmateriale er nedmuldet.

Plantemateriale fra afgrøder behandlet med Matrigrøn 72 må ikke anvendes i drivhuse eller i kompost.

Sprøjeteknik og vandmængde

Matrigrøn 72 skal udbringes med en marksprøjtning, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjeteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladdisligning. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

Eksempel på sprøjeteknik

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladspred)	2,5	5,5 km/t

Tilberedning af sprøjtevæske

Sorg altid for, at sprøjtningen er korrekt rengjort samt efterstør for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjtningen har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr tilsættes den ønskede mængde Matrigrøn 72 ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen.

Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllensystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Matrigrøn 72 i fyldestationen. Eventuelt additiv tilsættes til sidst.

Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens anbefalinger.

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave

Bemærk! Skyllvandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæskan kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

– Dette gælder under alle rengøringsprocesser.

– Husk at tomme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæskan og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal.

– Ved hjælp af de indvendige spuleudstyr vaskes sprøjtekan, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.

– Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear[®] Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuleudstyr køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørse.

– Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand, – Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Personlige værnemidler:

– i henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved opblanding/ rengøring: Anvend beskyttelsesbriller, -handsker og støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredébom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Resistensstrategi

Produktnavn	Type	Aktivstof	HRACgruppe	Risiko for udvikling af resistens
MATRIGON 72	HERBICID	clopyralid	4 (0)	Lav

Corteva Agriscience anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Corteva Agriscience, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Lagring

Opbevares tørt og frostfrit

Bortskaffelse

Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan. Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fratægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Sprøjt med omlanke

Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandskab. Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

Varemærke - FMC Agricultural Solutions



Matrigon™ 72

UKRUDTSMIDDEL

GROUP 4 (0) HERBICIDE

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisning se næste side.

Ukrudtsmiddel nr. 64-136

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Clopyralid 720 g/kg (72 % w/w).

(formuleret som clopyralid-olamine 949 g/kg (94,9 % w/w)).

Nettoindhold: 1 kg.

Midlet er et vandopløseligt granulat.

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, 1411 København K
Tlf. 45 28 08 00, www.corteva.dk**

™ © Trademarks of Corteva Agriscience
and its affiliated companies



3 362130 195344 >

NETTOINDHOLD: 1 KG

273833 2212

BASE LABEL

BASE LABEL