

**ADVARSEL**

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (E.U.H401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekämpelse i korn.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 32.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, sør mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**Førstehjælp:**

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Ved hudirritation: Sog lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmedset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.



# Mustang™ Forte

## UKRUDTSMIDDEL

UFI: OD05-C0Q3-000J-Y141

Må kun anvendes til ukrudtsbekämpelse i korn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 64-70

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekämpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:**

Aminopyralid 10 g/L (0,94% w/w).

(formuleret som aminopyralid-K-salt 11,83 g/l (1,12 % w/w)).

Florasulam 5 g/l (0,47 % w/w).

2,4-D 180 g/l (16,98 % w/w).

(formuleret som 2,4-D-ethylhexyl 271,49 g/l (25,61 % w/w)).

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT).

6 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et suspsemulsionskoncentrat.

**Batch nr. og produktionsdato:** Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, 1411 København K

Tlf. 45 28 08 00, [www.corteva.dk](http://www.corteva.dk)

TMTrademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

3 362130 097204 >  
0285266



**NETTOINDHOLD: 5 LITER**

2402

## Teknisk information

Mustang Forte er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinter- og vårsæd om foråret.

Mustang Forte bekæmper bl.a. burresnerre, kamille, snerle-pileurt, valmue, kornblomst, hvidmelet gåsefod, fuglegræs, korsblomstret ukrudt og agertidsels.

Mustang Forte må kun anvendes en gang i samme afgøde.

Mustang Forte må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter, samt i korn til helsæd.

## Virkemåde

Mustang Forte indeholder ALS-hæmmeren florasulam og auxindannerne aminopyralid og 2,4-D

Mustang Forte optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter vil der, alt efter ukrudtsart, ses begyndende symptomer fra få dage til få uger efter behandling. Den fulde effekt ses fra 3-4 uger efter behandling

## Klimaforhold ved anvendelse

Optimal temperatur for anvendelse er mellem 5-20° C.

Undgå sprøjtninger under meget tørre og varme forhold eller forud for frost.

Undgå at behandle når afgrøden er under stress fra kulde, tørke, står i vandlidende jord, angrebet af skadedyr, lider af mangel på næringsstoffer etc.

## Dosering- og anvendelsesvejledning

Afgøde	BBCH	Dosering, l/ha	Ukrudtsarter og forventet effekt	
			85-100%	70-84%
Vårbyg Vårhvede Havre	13-20	0.3	Raps, hyrdetaske, kornblomst, hvidmelet gåsefod, storkenæb, kamille, mark forglemmegej, snerle-pileurt, fersken-pileurt, ager-sennep og fuglegræs	Læge-jordrøg, burresnerre, rød tvetand, ager-stedmoderblomst og skærm-vortemælk
		0.5	Som ovenfor samt: pengeurt	Gul okseøje, agertidsel, skærm-vortemælk, burresnerre, vej-pileurt og pengeurt
	21-32	0.75	Som ovenfor samt: Gul okseøje, burresnerre, ager-svinemælk og vej-pileurt	Agertidsel, skærm-vortemælk, hanekro og pengeurt

Afgøde	BBCH	Dosering, l/ha	Ukrudtsarter og forventet effekt	
			85-100%	70-84%
Vinterhvede Rug Triticale Vinterbyg	23-29	0.5	Hyrdetaske, kornblomst, hvidmelet gåsefod, burresnerre, lugtløs kamille, fuglegræs og mark forglemmegej	Hanekro
			Som ovenfor samt: valmue og pengeurt	Hanekro
	30-32	1.0	Som ovenfor samt: raps, kornridderspore, hanekro og ager-sennep	Agertidsel

Maksimalt én behandling per afgøde per vækstsæson. Den maksimalt tilladte dosering bestemmes af afgøde og tidspunkt for behandling.

## Additiv

Det er normalt ikke nødvendigt at tilsætte additiv til Mustang Forte.

## Jordtyper

Mustang Forte kan den anvendes på alle jordtyper.

## Regnfasthed

Mustang Forte er regnfast efter 1 time

## Tankblandinger

Mustang Forte kan ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-p-ethyl eller clodinafop.

## Omsåning

Ved omsåning kan der kun etableres korn, græs eller majs.

Forud for genetablering bør eventuelle planterester indarbejdes i jorden ved kraftig harvning eller pløjning.

## Efterfølgende afgøde

Fra det følgende efterår kan der etableres korn, raps, græs og majs.

Da Mustang Forte indeholder aminopyralid, skal der gå 14-24 mdr. mellem Mustang Forte behandlingen og etablering af følgende følsomme afgøder:

**14 mdr.:** Kartofler og andre natskyggearter, sukkerroer, løg, gulerod og andre skærplanter.

**24 mdr.:** Ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter, agurk, salat og andre kurvblomstrede.

## Plantemateriale og efterfølgende afgrøde

Halm og staldgødning/dybstrøelse indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte, må ikke anvendes:

- I drivhuse, til kompost eller produktion af champignon
- Til tildækning af bredbladede afgrøder.
- I biogasanlæg

Efter anvendelse af 0,5 l/ha Mustang Forte eller mindre, anbefales det at indarbejde halm samt staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte, senest 4 mdr. før etablering af andre afgrøder end korn, raps, græs og majs.

Efter anvendelse af mere end 0,5 l/ha Mustang Forte gælder følgende retningslinier (for halmhåndtering):

- Halm må kun bortføres fra ejendommen til industriel brug eller afbrænding.
- Halm eller staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) som indeholder halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte:
  - Kan indarbejdes i jorden når som helst før etablering af korn, raps, græs og majs
  - Skal indarbejdes i jorden min. 7 mdr før etablering af andre afgrøder.

## Personlige værnemidler

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

**Ved opblanding:** Anvend overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.

**Ved udspøjning:** Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler.

Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler.

Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

## Sprøjteknik og vandmængde

Mustang Forte skal udbringes med en marksprøje, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

For at undgå risiko for afdrift, bør der ved behandling langs markskel og marker med følsomme afgrøder være særlig opmærksomhed på sprøjteknik og vindforhold.

## Eksempel på sprøjteknik

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladsprede)	2,5	5,5 km/t

## Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

**Præparatfyldeudstyr:** Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og Mustang Forte fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen.

Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Mustang Forte i fyldestationen.

**Direkte injektion:** Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.

## Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave

**Bemærk!** Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventilér samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser.

- Husk at tömme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal.
- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprojetank, slanger og bom straks efter endt sprøjting med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjting foregår af 2-3 gange.
- Fyld vand i tanken - 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilset 0,5 liter All Clear<sup>1</sup> Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøj lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

- Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

### **Udvendig rengøring af sprøjteudstyr**

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

### **Resistensstrategi**

Produktnavn	Type	Aktivstof	HRAC gruppe	Risiko for udvikling af resistens
MUSTANG FORTE	HERBICID	Florasulam	B	Høj
		Aminopyralid 2,4-D	O	Lav

Corteva Agriscience anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Corteva Agriscience anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Corteva Agriscience at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædkiftet. Det anbefales endvidere at have både vå- og vinterafgrøder i sædkiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

### **Lagring**

Opbevares tørt og frostfrit.

### **Tom emballage**

Indholdet/ beholderen bortsaffaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortsaffaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortsaffaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskeren.

Emballagen må ikke genbruges.

### **Producentansvar**

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål.

Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

<sup>1</sup> Varemærke – FMC Agricultural Solutions

## ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 32.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, sør mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



## Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.



# Mustang™ Forte

## UKRUDTSMIDDEL

UFI: OD05-C0Q3-000J-Y141

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 64-70

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

### Analyse:

Aminopyralid 10 g/l (0,94% w/w).

(formuleret som aminopyralid-K-salt 11,83 g/l (1,12 % w/w)).

Florasulam 5 g/l (0,47 % w/w).

2,4-D 180 g/l (16,98 % w/w).

(formuleret som 2,4-D-ethylhexyl 271,49 g/l (25,61 % w/w)).

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT).

6 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations-toxicitet.

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, 1411 København K

Tlf. 45 28 08 00, [www.corteva.dk](http://www.corteva.dk)

TMTrademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.



3 362130 097204 >

**NETTOINDHOLD: 5 LITER**