

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πιείτε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί ερύσημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιαντρό. Μαζέψτε τη χυμίνη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περαιτέρω σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει απασαρούς ή είναι αναίσθητος.

Σε περίπτωση κατάποσης: να μη προκληθεί εμετός. Καλέστε αμέσως γιαντρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιαντρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπαιε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθώνα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιαντρό.

Αντιδότη: Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφαιρέσει μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε α κροφύσα 75% μειωμένης διασποράς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το υλικό συσκευασίας ξεπλύνονται από πίσω ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρόπο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναπαίθονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. παρτίδας - Ημ/νία παρασκευής- Ημ/νία λήξης:
βλέπε φύλλη



Clincher™
NEO 200EC

ZIZANIOKTONO

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Cyhalothr-butyl: 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 78.95 % β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων στο ρύζι

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

A.A.Δ.A.: 70042/ 15.05.2013

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889700

¹⁾ * Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των αραίο-φαινό-τροπονικών οξέων για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων στο ρύζι. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων με δράση στην καρβοξυλάση που απελευθερώνει τον Α. Η ανάπτυξη του φυτού επιβραδύνεται μόλις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή, παρόλο που τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 2-3 ημέρες αργότερα, ενώ για το τελικό αποτέλεσμα απαιτείται περίπου μια εβδομάδα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων στο ρύζι.
Δόση: 100-150 κ.κ./ στρέμμα (max). Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια έχουν 1-4 φύλλα και το ρύζι βρίσκεται σε στάδιο από 1 φύλλο μέχρι το τέλος του αδερφίσματος.
Μέγιστος αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-40 λίτρα/στρέμμα.
ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ:
Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχίτσια, Λιπτοχλόα, Πάγκο-κχυρί, Νεραργισό.
Μετριας ευαίσθητα ζιζάνια: Αματόχορτο, Σπάρτια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με καθολικό ψεκασμό με κατάλληλο ψεκαστικό μηχανήμα, με μέση μικρότερη των 3 στρογγυλών (45 PSI) και όγκο ψεκαστικού διαλύματος 40 λίτρα/ στρέμμα.
Επισημώσεις σε στεγνωσιμότητα κρούσης: Το ψεκαστικό δόμα εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του καρικού. Τα καρίκια κατακλύζονται με νερό μέσα στις επόμενες 48 ώρες από την εφαρμογή. Το φως του νερού παραμένει σταθερό > 10 εκ. για τουλάχιστον 48 ώρες, ενώ τα καρίκια παραμένουν κλειστά. Εφαρμογή σε κατακλυζιμότητα κρούσης: Γίνεται καθολικός ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του καρικού με ψεκαστικό μηχανήμα. Το βάθος του νερού πρέπει να είναι 6-10 εκ. Τα καρίκια συμπληρώνονται με νερό με το ύψος του να παραμένει σταθερό > 10 εκ. για τουλάχιστον 4-6 ημέρες, με τα καρίκια κλειστά. Χρειάζεται προσοχή και στους δύο τρόπους εφαρμογής έτσι ώστε να πέσει η συνιστώμενη δόση εφαρμογής στο στρέμμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι στις ποικιλίες indica και japonica ακόμη και στις υψηλές δόσεις, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ρύζι: 60 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδραση στο βυτίο. Απαγορεύουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδραση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Μην αφήνετε το μείγμα στη δεξαμενή για περισσότερο από τον απαιτούμενο χρόνο για τη διανομή και, σε κάθε περίπτωση, εκτελέστε την εφαρμογή εντός 6 ωρών από την παρασκευή του διαλύματος. Να θυμάστε ότι η εφαρμοζόμενη διανομή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα της εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: - Φυλάξτε το χωριστά από άλλα Γ.Φ., Απώματα και σπόρους. - Χρησιμοποιείστε χωριστό ψεκαστικό μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. - Μην αποψεκάσετε τα άκρα των ζωνών.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Δεν αναμένονται προβλήματα στις συνήθεις καλλιέργειες αμφοισποράς, από τη χρήση του CLINCHER Neo στο ρύζι στη χώρα μας.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Εισέλθετε ξανά στις περιοχές που χρησιμοποιήθηκε το προϊόν μόνο εφόσον στεγνώσει τελείως η επιφάνεια του φυλλώματός.

Blank area
for in-house print of
2D data matrix code



Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.