



Dow AgroSciences

Kerb™

50 WP

ХЕРБИЦИД

у облику квашљивог прашка (WP) беличасто беж боје

Број дозволе: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 321-02-00020-723/2005-11 од 27.01.2006, измена решења бр. 321-01-1163/2011-11 од 21.03.2012. и 321-01-56/2012-11 од 27.12.2013. и решење број 321-01-1511/2016-11 од 4.12.2017. издато од стране Министарства Пољопривреде и Заштите животне средине.

Обавештења о опасности

H351 – Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.

H411 – Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештења о мерама предострожности

P202 – Пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и безбедности.

P281 – Користити потребну личну заштитну опрему.

P391 – Сакупити просути садржај.

P501 – Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним и националним прописима.

Произвођач: Dow AgroSciences GmbH, Аустрија

Рок трајања: 2 године, ако се правилно складишти.

Број шарже: F47011A13C

Датум производње: 14.01.2018.



ПАЖЊА!

1 kg

Увозник и дистрибутер:



Agrimatco

Народног фронта 73/1, ПОВ 8
21102 Нови Сад

Telefoni: 021/ 469-629 ; 469-580

ПРЕ УПОТРЕБЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна материја: **propizamid**.....500 ± 25 g/kg

CAS бр: 23950-58-5

ПРИМЕНА: Kerb™ 50-WP се користи као селективни системични хербицид:

1. У салати, за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова, у количини 3 kg/ha (30 g на m²);

а) На површинама за производњу салате, третирањем добро припремљеног земљишта пре пресађивања, уз обавезну инкорпорацију на дубини од 2-4 cm или

б) После укоренења (примања) салате.

2. У усеву шећерне репе, за сузбијање вилине косице (*Cuscuta spp.*) у количини 3-4 kg/ha (30-40 g на 100m²), третирањем када репа развије 9-7 листова, односно када се вилина косица прихвати за репу;

3. У заснованој луцерки, за сузбијање вилине косице (*Cuscuta spp.*) у количини 3-4 kg/ha (30-40 g на 100m²), третирањем после првог кошења. Примењује се прскањем уз утрошак воде: 300-600 l/ha (3-6 l на 100m²). Припрема средства: потребну количину препарата растворити у мало воде да се добије каша која се преноси у резервоар прскалице, претходно до половине напуњен водом, затим допунити резервоар потребном количином воде уз стално мешање.

Kerb™ 50-WP се може највише једном употребити на истој површини у току године. При руковању препаратом користити гумене рукавице, а забрањено је јести, пити и пушити. По завршетку рада опрати руке водом и сапуном. Пазити да средство не доспе у водотокове.

КАРЕНЦА: 42 дана за салату и луцерку; за шећерну репу обезбеђена временом примене.

СКЛАДИШТЕЊЕ: Препарат складиштити у затвореној, оригиналној амбалажи, под кључем, на сувом, тамном и проветреном месту, одвојено од хране, пића и сточне хране и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

НАПОМЕНА КОРИСНИКУ:

Kerb 50WP се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају препоручене примене.

НАПОМЕНЕ:

- није довољно ефикасан за сузбијање корова у салати, ако се примењује на јако хумусним земљиштима (> 5% хумуса);
- забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва;
- спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом;
- уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода;
- спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева;

Са неутрошеним количинама препарата поступити у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гл. РС 36/09)

ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ

У случају потребе обратити се:

Национални центар за контролу тровања

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Београд, Црнотравска 17

Тел: 011/36-08-440



ПАЖЊА!