

UFi: EX49-60TV-S00Q-DQGR

**Faroangivelser:**

H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Skyddsangivelser:**

P280 - Använd ögonskydd och skyddshandskar.

P319 - Samla upp spill.

P264 - Tvätta händerna grundligt efter användning.

P501 - Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

**Första hjälpen:**

P305+P351+P338 +P310 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:  
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

**Personlig skyddsutrustning:**

Ögonskydd och skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under 75 dagar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.



278818

2403

I de fall utrustning som reducerar avdriften krävs ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



**FARA**

**Särskilda miljörisiker:**

SP1 - Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.  
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av «Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom».  
Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas.

**NETTOMÄNGD: 5 L**



3 362130 187639 >



**Univoq™**  
Intreq<sup>®</sup> active



**SVAMPMEDEL**

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 5954

GROUP 21 3 FUNGICIDE

UFI: EX49-60TV-S00Q-DQGR

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

**ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK**

Läs medföljande anvisningar före användningen.

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Mot svampangrepp i odlingar av höstvetete, durumvetete, speltvetete, höstrågvetete, höstråg, vårvete, vårrågvetete, vårråg.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

**Innehavare:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark, tf. +45 45280800

**Importör:** Corteva Agriscience AB, Box 7199, 103 88 Stockholm, [www.corteva.se](http://www.corteva.se)

™ Trademarks of  
Corteva Agriscience  
and its affiliated  
companies



278822

2403

**Övriga villkor:**

Produkten ska skakas före användning.

**Verksamma beståndsdelar:**

Fenpicoxamid 50 g/l (4,8 % w/w)  
Protioconazol 100 g/l (9,6 % w/w).

**Innehåller:** N,N-dimetyloktanamid  
**Beredningsform:** emulgerbart koncentrat (EC).

**Lagring:** Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning.

**Tomemballage:** Tom förpackning får inte återanvändas.

**Satsnummer och tillverkningsdag:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

**MANDATORY REQUIREMENT:  
THIS AREA MUST BE BLANK (for 2D Data Matrix,  
Lot Nr., Manufacturing Date ...)**

**NETTOMÄNGD: 5 L**

### Bruksanvisning

Univoq har en foliär aktivitet mot ett brett spektrum av spannmålsjukdomar. Univoq har en överlägsen effekt på svartpricksjuka, brunfläcksjuka och gulrost, samt god effektbrunrost (vete, råg & rågvete), vetets bladfläcksjuka (DTR), mjöldaggssvampar och sköldfläcksjuka. Moderat effekt uppnås på Fusarium och även viss effekt på stråknäckare.

### Verkningsätt

Univoq är en skyddande och kurativ fungicid med translaminära egenskaper för kontroll av en rad sjukdomar i alla sorter av vete och durumvete, spelt, råg och rågvete, inklusive grinsådd. När Univoq appliceras på grödan, binder det till det kutikulära vaxet, förblir stabilt och fungerar som en materialreservoar och tränger med tiden in i bladen vilket ger en mycket god långsiktig kontroll av sjukdomar.

### Användning

Univoq kan användas med en maximal mängd av 1,5 l/ha per behandling. Max en behandling per säsong.

Den tidigaste appliceringstidpunkten är BBCH 30 (början av stjälkens förlängning).

Den senaste appliceringstidpunkten är BBCH 69 (slutet av blomning).

Den idealiska tidpunkten för applicering är att applicera i en skyddssituation.

Applicera Univoq under goda odlingsförhållanden. Undvik applicering på stressade grödor.

Non-printed area on  
page 2 ONLY  
Label A-code +  
barcode area

Non-printed area on page 2 ONLY  
(on the back of 2D code area  
printed on the front page)

### Doseringstabell

Gröda	BBCH	Sjukdomskontroll	Dos (l/ha)	Kommentarer
<b>Höst- och vårvete</b> <b>Durumvete</b> <b>Spelt</b> med och utan insådd av gräs.	30–69	<b>Utmärkt kontroll</b> Svartpricksjuka, gulrost Brunfläcksjuka (LEPTNO) <b>God kontroll</b> Vetets bladfläcksjuka, Vetebrunrost (PUCCRT) mjöldagg. <b>Moderat kontroll</b> Fusarium.	1 x 1,5	För kontroll av vetets svartpricksjuka kan dosintervallet 1,2–1,5 l/ha användas. 1,2 l/ha vid låga infektionsförhållanden av vetets svartpricksjuka.
<b>Höst- och vårråg</b> med och utan insådd av gräs.	30–69	<b>God kontroll</b> Brunrost (PUCCRE) Sköldfläcksjuka, mjöldagg. Brunfläcksjuka (LEPTNO) <b>Moderat kontroll</b> mjöldagg		
<b>Höst- och vårrågvete</b> med och utan insådd av gräs.	30–69	<b>Utmärkt Kontroll</b> Svartpricksjuka. Brunfläcksjuka (LEPTNO) <b>Good control</b> Gulrost, Rågbrunrost (PUCCRT) mjöldagg. <b>Moderat kontroll</b> Fusarium		

### Jordtyper

Univoq kan användas på alla jordtyper.

### Klimaförhållande vid användning

Applicera Univoq under goda odlingsförhållanden. Undvik applicering på stressade grödor.

### Regnfasthet

När sprutvätskan har torkat in.

### Efterföljande gröda

Inga restriktioner för efterföljande grödor vid en normal växtföljd.

### Omsådd

Inga restriktioner vid omsådd.

### Vätmedel

Inget behov av vätmedel / tillsatsmedel.

### Blandningar

Univoq kan tankblandas med relevanta växtskyddsmedel.

### Spruteteknik och vätskemängd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruks-spruta med bom". Broschyren finns på [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se). Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. I de fall utrustning som reducerar avdriften krävs ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Univoq ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av spruttillverkaren.

Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en spruteteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

### Beredning av sprutvätska

Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor.

Produkten ska skakas före användning.

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd preparat.

**Preparatpåfyllare:** Vid användning av preparatpåfyllare, fylls halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd av preparat. Därefter sugs vätskan upp i sprutan samtidigt som rent vatten tillförs.

Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns.

**Preparatdosering:** Vid användning av preparatdosering hänvisas användaren till spruttillverkarens rekommendationer.

### Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning

**Observera!** Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser.

Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

– Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt sköljvattentank ska sprutas ut på den behandlade arealen.

– Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.

– Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear<sup>1</sup> Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta lite av sköljvattentank ut genom slangar, ramp och munstycke så de blötlägges. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.

– Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear Extra/ 10 liter vatten.

– Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattentank sprutas ut genom ramp och munstycke.

### Utvändig rengöring av sprutor

Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

### Resistensstrategi

Produkt	Typ	Aktiv substans	HRAC grupp	Risk för resistensutveckling
Univoq	FUNGICID	Fenpicoxamid	C4#21	Medel till Hög
		Prothioconazole	G1#3	Medel

Univoq är en samformulerad mix av fenpicoxamid och prothioconazol. Fenpicoxamid tillhör FRAC grupp C4 #21. Fenpicoxamid är inte kors-resistent till någon av de kommersiella fungiciderna som idag används på marknaden i spannmål. Univoq innehåller också prothioconazol, som är medlem i DMI fungiciderna. Behandla målsjukdomen enligt instruktion med Univoq i det specifikt indikerade växtstadiet. Använd Univoq som en del i Integrated Crop Management (ICM) strategin. Besök FRAC's hemsida för mer förebyggande råd gällande resistens i stråsäd.

### Lagring

Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning

### Tomma emballage

De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Skölvattnet häller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiotvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar.

Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar ([www.svepretur.se](http://www.svepretur.se)).

Corteva Agriscience AB är medlem av Svenskt Växtskydd.

<sup>1</sup> Varumärke – FMC



**Univoq™**  
Inatreq™ active

**SVAMPMEDEL**

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 5954

GROUP	21	3	FUNGICIDE
-------	----	---	-----------

UFI: EX49-60TV-S00Q-DQGR

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

#### ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

#### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Mot svampangrepp i odlingar av höstvetete, durumvetete, speltvetete, höstrågvete, höstråg, vårvete, vårrågvete, vårråg.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

**Innehavare:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark, tlf. +45 45280800

**Importör:** Corteva Agriscience AB, Box 7199, 103 88 Stockholm, [www.corteva.se](http://www.corteva.se)

™ Trademarks of  
Corteva Agriscience  
and its affiliated  
companies



278822

2403

#### Övriga villkor:

Produkten ska skakas före användning.

#### Verksamma beståndsdelar:

Fenpicoxamid 50 g/l (4,8 % w/w)  
Protiokonazol 100 g/l (9,6 % w/w).

**Innehåller:** N,N-dimetyloktanamid  
**Beredningsform:** emulgerbart koncentrat (EC).

**Lagring:** Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning.

**Tomemballage:** Tom förpackning får inte återanvändas.

**Satsnummer och tillverkningsdag:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

**NETTOMÅNGD: 5 L**