

Varning



Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

6 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/
Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Första hjälpen:

PP333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONCENTRAL eller läkare.

Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Verksamma beståndsdelar:

Florasulam 5 g/l (0,47 % w/w)

2,4-D (ethylhexylester) 271,5 g/l (25,61 % w/w)

(motsvarar 180 g/l 2,4-D)

Aminopyralid kaliumsalt 11,83 g/l (1,12 % w/w)

(motsvarar 10 g/l aminopyralid)

Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on.

Beredningsform: SE-Suspensionsemulsion

Lagring: Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 5266



MustangTM Forte

OGRÄSMEDEL

GROUP 2 (B) HERBICIDE

GROUP 4 (O) HERBICIDE

UFI: 0D05-C0Q3-000J-Y141

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, höstråg, höstrågvete ovh vårhavre.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, Köpenhamn K, Danmark, tlf. +45 4528 0800

Importör: Corteva Agriscience AB Box 7199, 103 88 Stockholm, www.corteva.se

TM Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



NETTOMÄNGD: 5 LITER

0276449

2209

Bruksanvisning

Mustang Forte är en systemisk herbicid för kontroll av örtogräs i höst- och vårsäd på våren. Mustang Forte bekämpar ett brett spektrum av örtogräs såsom, snärjmåra, våtarv, blåklint, åkerbinda, baldersbrå, målla och tistel. Behandla inte gröda som är insädd med baljväxter, t.ex klöver. Endast en applicering per gröda och odlingsåsong.

Verkningsätt

Mustang Forte innehåller ALS-hämmaren florasulam och auxinerna aminopyralid och 2,4-D. Alla substanserna verkar systemiskt i plantan. På känsliga ogräsarter ses begynnande symptom, beroende av ogräsart, från ett par dagar till ett par veckor efter behandling. Full effekt ses 3-4 veckor efter behandling.

Klimatförhållanden vid användning

Optimala klimatförhållanden vid Mustang Forte behandlingar är mellan 5-20°C. Undvik behandlingar under väldigt torra och varma förhållanden samt innan nattfrost. Behandla inte grödor som lider av stress. Stress kan orsakas av många olika faktorer såsom, frost, torka, översvämningar, näringsbrist, sjukdomar, insektsangrepp etc.

Doserings- och användningstabell

Gröda	BBCH	Dosering, l/ha	Känsliga och mycket känsliga ogräs (85-100% effekt)	Måttligt känsliga ogräs (70-84% effekt)
Höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn	21-32	0,5	Lomme, blåklint, svinmålla, snärjmåra, baldersbrå, åkerförgåtmeje, våtarv, riddarspore och penningört	Raps, pipdån, vallmo och åkersenap
		0,75	<i>Som ovan samt:</i> Vallmo och åkersenap	Raps, åkertistel och pipdån
		1,0	<i>Som ovan samt:</i> Raps, pipdån	Åkertistel
Vårkorn, vårvete och vårhavre	13-20	0,3	Raps, lomme, blåklint, svinmålla, skatnäva, baldersbrå, åkerförgåtmeje, åkerbinda, åkerpilört, åkersenap och våtarv	Jordrök, snärjmåra, rödplister, åkerviol och revormstörel
		0,5	<i>Som ovan samt:</i> Penningört	Gullkrage, åkertistel, revormstörel, snärjmåra, trampört och penningört
	21-32	0,75	<i>Som ovan samt:</i> Gullkrage, snärjmåra, åkerbinda, åkerpilört, åkermolke och trampört.	Åkertistel, revormstörel, pipdån och penningört

Additiv

Mustang Forte har normalt inget behov av additiv.

Jordarter

Mustang Forte kan användas på alla jordarter.

Regnfasthet

Mustang Forte är regnfast 1 timme efter behandling.

Blandningar

Mustang Forte kan inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop-P.

Omsådd

Vid omsådd kan det endast säas stråsåd, gräs eller majs.

Före omsådd bör eventuella växtrester nedbrukas i jorden genom djup harvning eller plöjning.

Efterföljande gröda

Stråsåd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsåsongen. Mustang Forte innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Mustang Forte

14 månader: Potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter.

24 månader Bönor, ärt och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallat.

Halmhantering

Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmaterial (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.

Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm måste inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsåd, raps, rybs, gräs och majs.

Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådana halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.

Rekommenderad skyddsutrustning vid användning

Vid beredning/rengöring: Använd skyddsglasögon, överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar.

Vid sprutning: Med sprutbommen mindre än 1 meter över marken, monterad på traktorn eller liknande, samt när arbetet utförs utanför eller utan förarhytt används överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar. Vid sprutning med sluten hytt (ventilationsanläggning ska vara avstängd) ska det inte användas särskild skyddsutrustning.

Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel".

Spruteteknik och vätskemängd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren finns på www.sakertvaxtskydd.se.

Mustang Forte ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av spruttillverkaren.

Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en spruteteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god neddrängning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

Beredning av sprutvätska

Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor.

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd preparat.

Preparatpåfyllare: Vid användning av preparatpåfyllare, fylls halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd av preparat. Därefter sugs vätskan upp i sprutan samtidigt som rent vatten tillförs. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns.

Preparatdoserare: Vid användning av preparatdoserare hänvisas användaren till spruttillverkarens rekommendationer.

Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning

Observera! Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt sköljvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear* Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta lite av sköljvattnet ut genom slangar, ramp och munstycke så de blötlägges.

Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.

- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsatt 50 ml All Clear Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

Utvändig rengöring av sprutor

Rengöring av spruta och traktor (sprutekepige) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

Resistensstrategi

Produktnamn	Typ	Verksam substans	HRAC grupp	Risk för utveckling av resistens
Mustang Forte	Herbucid	Florasulam	2 (B)	hög
		Aminopyralid och 2,4-D	4 (O)	låg

Corteva Agriscience rekommenderar en stark anti-resistens strategi. För att undvika resistensutveckling rekommenderar Corteva Agriscience, att det generellt används ogräsmiddel med olika verknings sätt i växtföljden. – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.

Lagring

Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning

Tomma emballage

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet häller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar.

Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Corteva Agriscience AB är medlem av Svenskt Växtskydd.

* Varumärke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

Varning



Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

6 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/
Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Första hjälpen:

PP333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONCENTRAL eller läkare.

Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Verksamma beståndsdelar:

Florasulam 5 g/l (0,47 % w/w)

2,4-D (ethylhexylester) 271,5 g/l (25,61 % w/w)

(motsvarar 180 g/l 2,4-D)

Aminopyralid kaliumsalt 11,83 g/l (1,12 % w/w)

(motsvarar 10 g/l aminopyralid)

Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on.

Beredningsform: SE-Suspensionsemulsion

Lagring: Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 5266



MustangTM Forte

OGRÄSMEDEL

GROUP 2 (B) HERBICIDE

GROUP 4 (O) HERBICIDE

UIF: OD05-COQ3-000J-Y141

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, höstråg, höstrågvete och vårhavre.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, Köpenhamn K, Danmark, tf. +45 4528 0800

Importör: Corteva Agriscience AB Box 7199, 103 88 Stockholm, www.corteva.se



3 362130 097266 >

TM Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

NETTOMÄNGD: 5 LITER