

Flexidor™

HERBICID



HERBICID

Flexidor™ je talni herbicid, ki vsebuje aktivno snov izoksaben in spada v skupino derivatov benzamida, med zaviralce sinteze celične stene. Koreninice vznikajočih plevelov vsrkajo sredstvo, posledično se zaustavi vgradnja leucina v beljakovinske molekule plevela ter razvoj hipokotila in rast korenin.

1. GLAVNE UPORABE

Flexidor™ se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela pred vznikom v:

- **poru**, gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo zgodaj po presaditvi, v razvojni fazi, ko je jasno viden drugi do četrti list (BBCH 12-14). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **česnu in čebuli**, gojenih na prostem, v odmerku največ 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od setve do razvojne faze, ko je jasno viden drugi list (BBCH 00-12). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **ozimni pšenici in ozimnem ječmenu** v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze po setvi do faze razvitih treh listov (BBCH 00-13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **okrasnem drevju in grmičevju**, pri gojenju na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se tretiranje dobro ukoreninjenih rastlin. Uporaba na sadikah se odsvetuje. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 50% celotne površine.
- **jablanah** v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze mirovanja do faze konca cvetenja (BBCH 00-69). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 30% celotne površine.
- **jagodah**, gojenih na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze mirovanja do faze začetka oblikovanja stolonov (BBCH 00-41) oziroma 1-3 tedne po saditvi. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **radiču vitlofu**, gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze popolnoma razvitih kličnih listov do faze razvitih šestih listov (BBCH 10-16). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **špargljih**, gojenih na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi pred vznikom špargljev in plevela. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 50% celotne površine. Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha.



HERBICID

2. MANJŠE UPORABE

»Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Flexidor™ pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Flexidor™ na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«.

Flexidor™ se kot manjša uporaba uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela pred vznikom na/v:

- **hruškah** v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze mirovanja do faze konca cvetenja (BBCH 00-69). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 30 % celotne obdelovalne površine.
- **šalotki**, gojeni na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od setve do razvojne faze, ko je jasno viden drugi list (BBCH 00-12). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **rabarbari**, gojeni na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo v razvojni fazi mirovanja (BBCH 00). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **baldrijanu**, gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presajanju. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **okrasnih čebulnicah in gomoljnicah ter okrasnih rastlinah z rizomi**, gojenih na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presaditvi na prosto. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **okrasnih rastlinah enoletnicah**, gojenih na prostem v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presaditvi na prosto. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **pašnikih** v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo takoj po setvi trave (BBCH 00), na ustrezno pripravljeno in vlažno površino. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
- **oljnih bučah** v odmerku največ 0,75 L/ha. Praktični nasvet za uspešno zatiranje plevela v odmerku 0,25 L/ha v bučah je opisan na zadnji strani prospekta. Priporoča se uporabo takoj po setvi in pred vznikom buč in plevela (BBCH 00) oziroma najpozneje 3 dni po setvi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha.



SPEKTER ZATIRANJA PLEVELA

Flexidor™ v odmerku 0,25 L/ha zatira naslednje plevela: njivsko pasjo kamilico (*Anthemis arvensis*), navadno njivko (*Aphanes arvensis*), navadni repnjakovec (*Arabidopsis thaliana*), samosevno ogrščico (*Brassica napus*), navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*), dlakavo penušo (*Cardamine hirsuta*), studenčno smiljko (*Cerastium fontanum*), spomladansko kokošnico (*Erophila verna*), navadno rosnico (*Fumaria officinalis*), žabje ločje (*Juncus bufonius*), njivsko mrtvo koprivo (*Lamium amplexicaule*), mrtvo koprivo (*Lamium sp.*), navadno njivno zrcalce (*Legousia speculum-veneris*), kamilico (*Matricaria sp.*), njivsko spominčico (*Myosotis arvensis*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), ptičjo dresen (*Polygonum aviculare*), navadni slakovec (*Fallopia convolvulus*), njivsko zlatico (*Ranunculus arvensis*), srhkodlakavo zlatico (*Ranunculus sardous*), njivsko redkev (*Raphanus raphanistrum*), nočni slizek (*Silene noctiflora*), njivsko gorjušico (*Sinapis arvensis*), navadno zvezdico (*Stellaria media*), navadni motovilec (*Valerianella locusta*), njivski jetičnik (*Veronica agrestis*), bršljanovolistni jetičnik (*Veronica hederifolia*), perzijski jetičnik (*Veronica persica*), jetičnike (*Veronica spp.*) in vijolico (*Viola sp.*).

Praktični nasvet za zatiranje plevela v bučah:

Pri zatiranju plevela v bučah lahko v odmerku 0,75 L/ha v primeru močnejših padavin po škropljenju pride do fitotoksičnosti na posevku. Zato za zatiranje plevela v bučah svetujemo kombinacijo Flexidorja in Centiuma najpozneje do 3 dni po setvi v odmerkih:

1. Flexidor™ (0,25 L/ha) + Centium® 36 CS (0,25 L/ha) – na težjih tleh, v primeru sušnih razmer in če ne pričakujemo dežja kmalu po škropljenju
2. Flexidor™ (0,2 L/ha) + Centium® 36 CS (0,25 L/ha) – na lažjih tleh, v primeru mokrih tal in če kmalu po škropljenju pričakujemo močnejše padavine

Pakiranja 250 ml, 1 L



Več informacij dobite v navodilu za uporabo in na www.corteva.si in www.karsia.si, (Karsia, Dutovlje, d.o.o.).