


Številka serije:

Datum proizvodnje:



Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.  
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrčila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**Varovanje okolja:** pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda.

**Znaki zastrupitve:** do sedaj niso znani znaki zastrupitve pri ljudeh. Lahko povzroči draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Prva pomoč:**

**Splošni ukrepi:** prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino ter ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

**Pri stiku s kožo:** odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijemo z vodo in milom.  
**Pri stiku z očmi:** s palcem in kazalcem razpremo očesni vek in oko temeljito speremo s čisto vodo. Odstranimo kontaktne leče, če jih imamo in če to lahko storimo brez težav. Nadaljujemo z izpiranjem. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.

**Pri vdihavanju:** ukrepamo v skladu s splošnimi ukrepi.

**Pri zaužitju:** usta temeljito speremo z vodo. Bruhanja ne izzivamo. Prizadeta oseba naj popije 2 do 3 dl vode. Nezavestni osebi ne smemo dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Posvetujemo se z zdravnikom.

**Navodilo zdravniku:** zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično in podporno.

**Način delovanja:** Delegate™ 250 WG je insekticid s širokim spektrom delovanja na škodljive žuželke. Uporablja se kot želodčni in dotikalni (kontaktni) insekticid za zatiranje mladih ličink žuči, takoj ko se izležejo in se aktivno hranijo. Nima sistemskih lastnosti in ga rastlina ne vsrka. Aktivna snov - *spinetoram* nastaja biološko pri fermentaciji bakterije *Saccharopolyspora spinosa*.

**Navodilo za uporabo:**

Sredstvo Delegate™ 250 WG uporabljamo:

- **na jablanah, hruškah, kutini in našijih** za zatiranje **jabolčnega zavijača** (*Cydia pomonella*), **breskovega zavijača** (*Cydia molesta*), **pasastega sadnega lupinarja** (*Pandemis heparana*), **sadnega zavijača** (*Adoxophyes orana*) in **Argyrotaenia pulchellana** v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko so plodiči večji od 10 mm (BBCH 71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat;
- **na hruškah** za zatiranje **navadne hruševke bošice** (*Cacopsylla pyri*) v odmerku 0,3 kg na ha za zatiranje druge generacije po napovedih opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Tretiramo po cvetenju. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat;
- **na breskvah, nektarinah in marelicah** za zatiranje **breskovega zavijača** (*Cydia molesta*), **breskovega molja** (*Anarsia lineatella*) in **cvetličnega resarja** (*Frankliniella occidentalis*) v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko plodiči odpadajo po cvetenju (BBCH 71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat;
- **na slivah in češpljah** za zatiranje **češpljevega zavijača** (*Cydia funebrana*) in **sadnega zavijača** (*Adoxophyes orana*) v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko plodiči odpadajo po cvetenju (BBCH 71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat;
- **na oljkah** za zatiranje **oljčnega molja** (*Prays oleae*) v odmerku 0,075 kg na ha, ob porabi 1000 do 1500 L vode na ha. Tretiramo v času, ko se pojavi druga generacija oljčnega molja (karpofagna generacija), ki dela škodo na plodičih oz. na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo dvakrat, minimalni razmik pri škropljenju je 28 dni.

**Fitotoksičnost:** sredstvo ni fitotoksično, če ga uporabljamo v skladu z navodili za uporabo.

**Karenca:** karenca za jabolane, hruške, kutine, našije, breskve, nektarine, marelice, slive in češplje je 7 dni, za oljke pa 21 dni.

**Opozorilo:** ne škropimo med cvetenjem.

**Mešanje (kompatibilnost):** sredstvo se ne meša z ostalimi fitofarmaceutskimi sredstvi.

**Priprava sredstva za uporabo:** odmerjeno količino sredstva zmešamo v manjši posodi z vodo, da dobimo poltekočo pasto. To vlijemo ob stalnem mešanju v rezervoar škroplilnice napolnjen s polovico potrebne količine vode. Nato dolijemo vodo do potrebne količine.

**Antirezistentna strategija:** za preprečevanje nastanka rezistence na *spinetoram* sredstva na podlagi spinosinov (*spinetoram* in *spinosad*) uporabimo največ trikrat na isti površini oziroma kulturi v isti rastni sezoni.

**Varstvo pri delu:** pri delu mora delavec paziti, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne sme tretirati v vročem in vetrovnem vremenu. Paziti je treba, da ne vdihava razpršenih delcev sredstva ali škroplilne brozge. Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škroplilne brozge ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice (EN 374-3) in delovno obleko (iz mešanice 65% poliestra in 35% bombaža, minimalne teže 230 g/m<sup>2</sup> in z vodooporno površino). Med škropljenjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škroplilnico ali pršilnikom s traktorjem, ki ima kabino, mora delavec uporabljati v prejšnjem odstavku navedeno delovno obleko in zaščitne rokavice (EN 374-2). Med škropljenjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škroplilnico ali pršilnikom s traktorjem brez kabine ter med škropljenjem visokih gojenih rastlin z ročno oprtno škroplilnico, mora delavec uporabljati certificirane nitrilne rokavice EN-374-2 in delovni zaščitni kombinezon s kapuco (kategorija III, tip 4). Med delom ne sme jesti, piti in ne kaditi. V primeru kontaminacije in/ali slabega počutja prekine z delom in ukrepa po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito umije z vodo in milom. Spere tudi napravo za škropljenje.

**Delovna karenca:** vstop na tretirano površino je delavcem dovoljen 48 ur po tretiranju. V primeru, da moramo opraviti delo v nasadu pred potekom 48 ur po končanem tretiranju, moramo nositi certificirane nitrilne rokavice EN-374-3 in delovni zaščitni kombinezon (iz mešanice 65% poliestra in 35% bombaža teže najmanj 230 g/m<sup>2</sup>).



Delegate™ 250 WG

INSEKTICID

Sredstvo za zatiranje rastlinskih škodljivcev na jablanah, hruškah, kutinah, našijih, breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, češpljah ter oljkah formulirano v obliki močljivih zrn (WG).

**Vsebuje:** spinetoram ..... 250 g/kg (25 % w/w); CAS št.: 935545-74-7

POZOR.

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sum škodljivosti za plodnost. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Vsebuje spinetoram. Lahko povzroči alergijski odziv.

Ne vdihavati razpršila. Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. Preprečiti sproščanje v okolje. Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Prestreči razlito tekočino. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. **Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 40 m v sadovnjakih in 20 m v oljčnikih do vodne površine. Zaradi zaščite neclijnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 20 m v sadovnjakih in 5 m v oljčnikih do kmetijske površine.** Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opravevalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

**UFI: CXNN-0E71-8002-NCD9**  
**Imetnik registracije:** Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.  
**Pooblaščen zastopnik in distributer:** KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si

**Številka odločbe o registraciji:** UVHVVR št.: U34330-5/2017/3 z dne 06.04.2017 z vsemi spremembami.

**Datum proizvodnje in številka serije:** na embalaži.

**Rok uporabe:** tri leta od datuma proizvodnje.

**KARSIA® VSEBINA: 100 G**



**Pogoji skladiščenja:** sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, temnem, zračnem in zaklenjenem prostoru. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

**Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta:** v primeru nesreče najprej pokličemo center za obveščanje 112. V primeru nesreče pri prevozu uporabimo vso predpisano zaščitno opremo, zavarujemo mesto nesreče in nanjo opozorimo ostale udeležence v prometu in preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam nudimo prvo pomoč in pokličemo zdravnika. V zaprtem prostoru razsuto sredstvo in poškodovano embalažo zberemo in damo v zbirnik posebnih odpadkov, da gre na uničenje. Tla in ostale umazane predmete očistimo z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, površinskih voda in podtalnice. V primeru požara gasimo s peno, CO<sub>2</sub>, suhimi kemikalijami ali vodo. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti ustrezno zaščitno obleko in dihalni aparat.

**Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo:** uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprazno embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škroplilno brozgo. Tako očiščeno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

**Splošne opombe:** proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvorno zaprti embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.

™ Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.

