



Package MID : 97076659 2010
Trade Name : MUSTANG FORTE
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU513
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 104471843/402079761 0530
Date : 15-OCT-2020
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



SGK is a Matthews International Corporation

EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

245mm

127mm

CORTEVA
agriscience

Mustang™ Forte

HERBICID

POZOR.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Preprečiti vdihavanje razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Prestreči razlito tekočino.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.
Pooblaščen zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si
™® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij. © 2021 Corteva.

UFI: 4FVG-5WM3-6009-THM0

3 830027 992289

CORTEVA
agriscience

Mustang™ Forte

HERBICID

Sredstvo za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ječmenu, tritikali in rži ter v jari pšenici, ječmenu in ovsu formulirano v obliki suspenzoemulzije (SE).

Vsebuje:
florasulam5 g/L (0,47 % w/w)
CAS št.: 145701-23-1
2,4-D kislina.....180 g/L (16,9 % w/w)
CAS št.: 94-75-7
v obliki 2,4-D 2-EHE288 g/L (25,6 % w/w)
aminopiralid10 g/L (0,94 % w/w)
CAS št.: 150114-71-9

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: U34330-28/18/8 z dne 4.6.2019, z vsemi spremembami.
Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.
Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Pred uporabo preberite priložena navodila.

Način delovanja: sredstvo MUSTANG™ FORTE je selektivni herbicid. V rastlino prehaja preko listov in se po rastlini hitro premika.
Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

VSEBINA: 1L

0970766592010

No other Barcode to be placed on top of the label Barcode

Package MID : 97076659 2010
Trade Name : MUSTANG FORTE
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU513
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 104471843/402079761 0530
Date : 15-OCT-2020
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black



SGK is a Matthews International Corporation

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

Varovanje okolja: pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Znaki zastrupitve: znaki zastrupitve so pojav slabosti in bruhanja, slinjenja, krči v mišicah, driska, zmedenost z otežkočenim govorjenjem, splošnega zmanjšanja motorike, ataksije in nekoordiniranosti ter izgube refleksov. Lahko povzroči simptome podobne astmi (občutljiva dihalna). Ponovna čezmerna izpostavljenost lahko poslabša obstoječo pljučno bolezen. Lahko povzroči rahlo draženje kože.

Prva pomoč:

Splošna ukrepi: prizadeto osebo čim prej umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom ter vročino. Zagotovimo ji osnovne življenjske funkcije. Takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: ravnamo se v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom. V primeru draženja kože poiščemo zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo delovne obleke operemo.

Stik z očmi: s palcem in kazalcem razpremo vekci prizadetega očesa in oko temeljito speremo s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: usta speremo s čisto vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Bruhanja ne izzivamo. Takoj pokličemo zdravnika. Nezavestnemu ne smemo dati ničesar piti, niti mu ne smemo izzivati bruhanja. Če je možno zdravniku predložimo navodila za uporabo sredstva.

Navodilo zdravniku: zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salnično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve.

Način delovanja: sredstvo MUSTANG™ FORTE je selektivni herbicid. V rastlino prehaja preko listov in se po rastlini hitro premika. Sredstvo blokira delovanje encimov pri sintezi aminokislin in avksinov, ki so rastni hormoni, odgovorni za rast rastlin. Plevel preneha z rastjo nekaj ur po tretiranju, v 7 do 10 dneh pride do deformacije listov in stebel, v 4 do 6 tednih plevel propade.

Navodilo za uporabo: sredstvo MUSTANG™ FORTE uporabljamo po vzniku posevka za zatiranje širokolistnega plevela:

a) v **ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni tritikali in ozimni rži** v odmerku 1 L/ha, v fenološki fazi od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32), ko ima enoletni širokolistni plevel 2-6 listov.

Sredstvo v odmerku 1 L/ha:

- odlično zatira naslednje plevela (95 -100 % učinkovitost): **bela metlika** (*Chenopodium album*), **njivska pasja kamilica** (*Anthemis arvensis*), **poljski mak** (*Papaver rhoeas*), **navadna zvezdica**

(*Stellaria media*), **kamilice** (*Matricaria* sp.), **njivski mošnjak** (*Thlaspi arvense*), **navadni slakovec** (*Polygonum convolvulus*), **ogrščica** (*Brassica napus* subsp. *napus*), **pelinolistna ambrozija** (*Ambrosia artemisiifolia*), **divja vijolica** (*Viola tricolor*);

- dobro zatira naslednje plevela (85-94,9 % učinkovitost): **plezajoča lakota** (*Galium aparine*), **navadni plešec** (*Capsella bursa-pastoris*), **orientalska ostrožnica** (*Consolida orientalis*), **žabji koprc** (*Descurainia sophia*), **navadna sončnica** (*Helianthus annuus*), **njivska vijolica** (*Viola arvensis*), **njivski osat** (*Cirsium arvense*), **njivska spominčica** (*Myosotis arvensis*);
- delno zatira naslednji plevel (70-84,9 % učinkovitost): **rosnice** (*Fumaria* spp.).

b) v **jari pšenici, jarem ječmenu in ovsu** v odmerku 0,8 L/ha, od fenološke faze, ko so trije listi razviti, do prvega kolenca (BBCH 13-32), ko ima enoletni širokolistni plevel 2-6 listov.

Sredstvo v odmerku 0,8 L/ha:

- dobro zatira naslednje plevela (85-94,9 % učinkovitost): **plezajoča lakota** (*Galium aparine*), **kamilice** (*Matricaria* sp.), **navadna zvezdica** (*Stellaria media*), **njivski mošnjak** (*Thlaspi arvense*);
- delno zatira naslednje plevela (70-84,9 % učinkovitost): **bela metlika** (*Chenopodium album*), **njivski osat** (*Cirsium arvense*), **navadni slakovec** (*Polygonum convolvulus*), **divja vijolica** (*Viola tricolor*).

Priporočena poraba vode: 200-400 L vode na ha.

Opozorila: s sredstvom lahko na isti površini tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni.

Sredstvo je najbolj učinkovito, ko je plevel v fazi od 2 do 6 listov. Na plezajočo lakoto deluje do 20 cm višine plevela, na kamilice do višine plevela 25 cm, za zatiranje njivske vijolice je potrebno plevel tretirati pred cvetenjem, osat pa v fazi rozete.

Preprečiti je treba zanašanje na sosednje gojene rastline, še posebno na križnice (npr. oljno ogrščico, oljno repico...), krompir, paradižnik, stročnice in sladkorno peso.

Nekatere sorte ovsa lahko kažejo začasno zaviranje rasti, ki pa ne vpliva na zmanjšanje količine pridelka. Sorto rži *Dankowskie diament* se ne sme tretirati s sredstvom, ker lahko pride do zmanjšanja količine pridelka.

Ne sme se tretirati po zmrzali oz. pred napovedano zmrzaljo, če so rastline v stresu zaradi nizkih temperatur zraka oz. pomanjkanja vode. Optimalna temperatura zraka v času tretiranja je od 7 do 25 °C.

OMEJITVE PRI UPORABI SLAME: v času žetve so v slami nizke vrednosti ostankov aktivne snovi *aminopirald*, ki jih v večinoma razgradijo mikroorganizmi v tleh. Tako slamo lahko inkorporiramo v tla ali pa jo uporabljamo za steljo in krmo za živali na lastni kmetiji.

Slama, tretirana s sredstvom, pa tudi gnoj ali kompost, ki vsebujeta slamo, tretirano s sredstvom, se lahko raztroši po njivi oziroma inkorporira v tla kadar koli pred setvijo koruze, žit, oljne repice ali trav, ob pogoju, da se jo inkorporira v tla najmanj 6 mesecev pred setvijo vseh drugih rastlin.

Slama, tretirana s sredstvom, se lahko uporablja tudi v industrijske namene, kot je proizvodnja papirja, ne sme pa se uporabljati za pridelavo gob, jagod in vrtnin.

Package MID : 97076659 2010
Trade Name : MUSTANG FORTE
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU513
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 104471843/402079761 0530
Date : 15-OCT-2020
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



SGK is a Matthews International Corporation

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

KOLOBAR: po tretiranju s predpisanimi odmerki v spomladanskem času, se lahko po pravilu pridelka na isto površino poseje/posadi naslednje rastline:

- v jeseni v istem letu tretiranja (najmanj 3 mesece po tretiranju): ozimna žita, ozimno oljno ogrščico, ljuljko in gorjušico;
- spomladi naslednje leto (najmanj 11 mesecev po tretiranju): jara žita, koruzo, oljno ogrščico, krompir, sladkorno peso, sončnice, čebulo iz semena, korenje, lan, glavnatno zelje, brokoli in trave;
- jeseni naslednje leto: vse poljščine razen stročnic;
- spomladi, najmanj 23 mesecev po tretiranju: vse poljščine, vključno s stročnicami (grah, soja, fižol, volčji bob), detelja, lucerna, sladka in pekoča paprika ter paradiznik.

V primeru propada posevka, tretiranega s sredstvom, se lahko na isto površino poseje samo žita, koruzo ali sirek, vendar mora od tretiranja s sredstvom miniti vsaj 30 dni, pri čemer je tla treba preorati vsaj do globine 15 cm.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): sredstvo ni fitotoksično, če ga uporabljamo v skladu z navodili. Glede možne občutljivosti posameznih sort žit se je pred uporabo sredstva treba posvetovati s proizvajalcem oziroma zastopnikom za sredstvo.

Mešanje: MUSTANG™ FORTE se meša z ostalimi fitofarmaceutskimi sredstvi. Imetnik registracije jamči, da mešanje ne vpliva na učinkovitost delovanja tega sredstva.

Antirezistentna strategija: sredstvo MUSTANG™ FORTE vsebuje 3 aktivne snovi.

Aktivni snovi *aminopirialid* in aktivna snov *2,4-D* spadata v skupino rastnih regulatorjev in je zanju nevarnost za razvoj odpornosti ocenjena kot nizka. Aktivna snov *florasulam* je zaviralec ALS in spada v skupino triazolopirimidinov, za katero je nevarnost za razvoj odpornosti ocenjena kot visoka. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Pojavu rezistence se lahko izognemo z menjavanjem ali mešanjem herbicidov, ki imajo različne načine delovanja.

Priprava sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s polovico potrebne količine vode. Nato ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebne količine.

Karenca: za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen, tritikalo, rž, oves je karenca 60 dni. Karenca za rastline, ki se bodo uporabile kot krma za živali, je 60 dni.

Varstvo pri delu: pri delu pazimo, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne škropimo ob vročem in vetrovnem vremenu. Ne smemo vdihovati razpršenih delcev sredstva. Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, predpasnik, trpežno obutev ali gumijaste škornje in ščitnik za obraz. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru onesnaženja in/ali suma na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ukrepati po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito umijemo in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva.

Delovna karenca: vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši.

Pogoji skladiščenja: sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem, zračnem in zaklenjenem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturi med 0 in 30°C. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krnil, ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče pri prevozu takoj pokličemo **center za obveščanje 112**, uporabimo vso predpisano zaščitno opremo, zavarujemo mesto nesreče in nanjo opozorimo ostale udeležence v prometu ter preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam nudimo prvo pomoč in pokličemo zdravnika. V zaprtem prostoru po razlitem sredstvu posujemo absorpcijsko sredstvo in ga zberemo ter ga s poškodovano embalažo damo v ustrezno označeno večjo posodo za odstranitev. Tla in ostale umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, površinskih voda in podtalnice. V primeru požara gasimo vedno le s prahom, peno, CO₂ ali razpršeno vodo. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti ustrezno zaščitno obleko in dihalni aparat.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljene sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!

Splošne opombe: proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvorno zaprti embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.



Package MID : 97076659 2010
Trade Name : MUSTANG FORTE
Country : SLOVENIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU513
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 104471843/402079761 0530
Date : 15-OCT-2020
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1


Black



SGK is a Matthews International Corporation

EU513 Leaflet Label Last page (fixed on base label)

PAGE 4





Package MID : 97076659 2010
Trade Name : MUSTANG FORTE
Country : SLOVENIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU513
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 104471843/402079761 0530
Date : 15-OCT-2020
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



SGK is a Matthews International Corporation

EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 5

231mm

127mm



POZOR.

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Preprečiti vdihavanje razpršila.

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščen zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si

™® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij. © 2021 Corteva.



UFI: 4FVG-5WM3-6009-THM0



Mustang™ Forte

HERBICID

Sredstvo za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ječmenu, tritikali in rži ter v jari pšenici, ječmenu in ovsu formulirano v obliki suspenzoemulzije (SE).

Vsebuje:

florasulam 5 g/L (0,47 % w/w)

CAS št.: 145701-23-1

2,4-D kislina 180 g/L (16,9 % w/w)

CAS št.: 94-75-7

v obliki 2,4-D 2-EHE 288 g/L (25,6 % w/w)

aminopiralid 10 g/L (0,94 % w/w)

CAS št.: 150114-71-9

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: U34330-28/18/8 z dne 4.6.2019, z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Pred uporabo preberite priložena navodila.

Način delovanja: sredstvo MUSTANG™ FORTE je selektivni herbicid. V rastlino prehaja preko listov in se po rastlini hitro premika.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

VSEBINA: 1L

Corner of base label
(shown red)
is cut out
to assist with booklet
opening