

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Sarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 16.02.2005 - 5023

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre (PHI) |
|----------------|---|--------------------------------------|--|
| Pamuk | Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera litoralis</i>) | 37,5 ml/da (2. ve 3. Dönem Larva) | 21 gün |
| Bağ* | Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>) | 40 ml/100 l su (Larva, Yumurtta) | 7 gün |
| Elma | Elma içkurdurdu (<i>Cydia pomonella</i>) | 60 ml/100 l su (Larva) | 14 gün |
| Domates (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera litoralis</i>) | 50 ml/da (Larva) | 1 gün |
| Biber (Sera) | Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) | 60 ml/da (Larva) | 1 gün |

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan **PRODIGY® 240 SC** önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama sırasında hazırlanan karışımın devamlı karıştırılması gereklidir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamayı tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



PRODIGY® 240 SC

Süspansiyon Konsantr (SC)

GRUP 18 İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

240 g/l Methoxyfenozide

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR SEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİNDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE SU İLE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözle temastan, geçici hafif tahriş sebep olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için **Önem İfadelerini (P280)** dikkate alınız.

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalmanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Bol miktarda su içirin ve doktor çağırın. Kusturma kararı hekim tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile 15 dakika süreyle iyice durulayınız. Kontak lensler mevcutsa 1-2 dakika sonra çıkarınız ve bir süre daha gözleri yıkamaya devam ediniz. Bir göz doktoruna danışınız.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

Soluması halinde: Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

™ Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Methoxyfenozide.



ZARARLILIK İFADELERİ

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208: 1,2-benzotiazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/koz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin

EUI401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- **PRODIGY® 240 SC** kelebek larvalarına karşı etkili bir bitki koruma ürünüdür.
- Mide yolu ile hedef zararlılara etki eder.
- Solvent ihtiva etmez.
- Kültür bitkilerine karşı emniyetlidir.
- Arıların aktif olarak polen topladığı dönemde ve kovanlar yakınında uygulama yapmayın. Uygulama için arıların aktif olmadığı sabah erken veya akşam geç saatleri tercih edin. Uygulamalar sırasında kovanları kapatın ve bitki koruma ürünü bitkiler üzerinde tamamen kuruyana kadar kapalı tutun.
- Sucul organizmalara zararlıdır. Sulama ve içme suyu kaynaklarına buluşturmayınız.
- Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla karışım hazırlamayınız.
- Boş kapları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önem İfadeleri: P501")

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıma aittir.



CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
ANADOLU KURUMLAR V.D. - 310 000 00 66
İc. Sicil No: 182593

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

26 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Devamı 2. sayfada...

Sayfa 1'in devamı...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

PRODIGY® 240 SC'den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştırılmadan her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Aynı üretim sezonu içerisinde üçten fazla kullanmayınız.

Bağda salım güvesi mücadelesinde uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Bağda salım güvesine karşı **ovisit uygulaması** için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz tepe noktaya ulaşmayıp, yükselmenin devam etmesi, etkili sıcaklık toplamının 1. Dölede en geç 95-100 gün dereceye ulaşması, salım fenolojisinin çiçek tomurcuğu döneminde olması; henüz yumurta bırakılmadan 2. dölede eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, etkili sıcaklık toplamının 450-460 gün dereceye ulaşması, salım fenolojisinin koruk döneminde olması ve henüz yumurtaların bırakılmamış olması; 3. dölede eşeyssel çekici tuzaklarda ilk kelebeklerin yakalanmaya başlaması, etkili sıcaklık toplamının 970-980 gün dereceye ulaşması, salımlarda tanelerin tatlanmaya başlaması, tüm bu koşulların sağlanması sonucu yapılan sayımlarda henüz yumurta bırakılmadan uygulama yapılır. **Larvisit uygulaması** için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamını birinci dölede 120 gün derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı ikinci dölede 520 gün derece, üçüncü dölede 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi birinci dölede çiçek tomurcuğu, ikinci dölede koruk, üçüncü dölede tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adında bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kolları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Elmada Elmaıçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkürdü mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Domateste (sera) pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacaktır uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde (sera) yeşilkurda karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

PRODIGY® 240 SC, adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 18 olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde **PRODIGY® 240 SC**'nin önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 18 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

PRODIGY® 240 SC'yi, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir. Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.



PRODIGY® 240 SC

Süspansiyon Konsantr (SC)

| | | |
|------|----|----------------------------|
| GRUP | 18 | İNSEKTİSİT (Böcek İlaç) |
|------|----|----------------------------|

240 g/l Methoxyfenozide

ÜRETİCİ FIRMA:

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.
82, Rue de Wittelsheim BP 90149
68701 Cemay Cedex / Fransa

RUHSAT SAHİBİ FIRMA

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreür /Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum için: + 90 538 973 22 00



Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri



Dr. Neşrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

26 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.