

HERBICIDA	
GRUPO	2
GRUPO	14

Ligate® Besty Pack

Parte sólida A: **Ligate®** gránulos dispersables (N° 36.831)
 Parte sólida B: **Capaz® 75 WG** gránulos dispersables (N° 32.958)

Composición:

Parte sólida A

sulfometurón metil

(metil-2 [[[(4-6 di-metil-2 -pirimidinil) amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato) 15 g

clorimurón etil

(etil 2-[[[(4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il) amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato) 20 g

ingredientes inertes c.s.p..... 100 g

Parte sólida B

sulfentrazone

N-[2,4-dicloro-5-[4-difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1 H-1,2,4-triazol-1-yl]fenil] metanesulfonamida.....75 g

coadyuvantes csp.....100 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 260

Lote N°: Ver envase.

Fecha de vencimiento: Ver envase.

Origen: Parte sólida A: Estados Unidos
 Parte sólida B: Estados Unidos

Inflamabilidad: Parte sólida A: No inflamable
 Parte sólida B: No inflamable

Contenido neto: Parte sólida A: 800 gramos
 Parte sólida B: 2400 gramos

Producido por: Parte sólida A: Agro Corteva Argentina S.R.L.
 Parte sólida B: FMC Química S.A.



Agro Corteva Argentina S.R.L.

Av. Del Libertador 498, Piso 12, CABA, (C1001ABR). Buenos Aires, Argentina.

Tel: (011) 4110-0201/0202

Tel: 0810-4444-369

www.corteva.com.ar

© Marca registrada de Corteva Agriscience LLC

© CAPAZ y FMC son marcas registradas de FMC Corporation



CUIDADO

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA**

PRECAUCIONES. MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Transporte: en el envase original sin abrir y acompañado de la hoja de datos de seguridad.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar indumentaria protectora adecuada: antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma. Evite el contacto con la boca, piel y ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca. **Para su seguridad después del tratamiento:** Higienizarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separadamente de la ropa de uso diario, antes de volverla a usar. Lavar los utensilios empleados en la preparación del producto. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado

RIESGOS AMBIENTALES:

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para algas: Extremadamente tóxico

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para abejas: Virtualmente no toxico

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas, ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Los envases vacíos no pueden volver a utilizarse, tampoco enterrar ni quemar. Para bidones y botellas de plástico respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado o Lavado a Presión siguiendo la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos perforándolos intentando no dañar la etiqueta. Los envases y bolsas inutilizados deben

enviarse a Centros de Almacenamiento Transitorio habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado en un lugar cubierto, ventilado, fresco y bajo llave. Evitar temperaturas extremas. Mantener apartado de alimentos para humanos, forrajes, semillas y otros plaguicidas.

DERRAMES:

Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto.

En caso de contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados, y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos separando los párpados.

En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada a un lugar ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir al vomito. Enjuagar la boca con abundante agua. Nunca suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

CLASE TOXICOLOGICA III - PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO

Toxicidad Inhalatoria: Categoría II (NOCIVO).

Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa.

Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos.

No sensibilizante dermal.

Grupo químico: Sulfonilureas y N-Phenyl-triazolinones. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

Parte sólida A: No existen síntomas específicos de intoxicación aguda.

Parte sólida B: En caso de ingestión es probable que ocurran vómitos, depresión, respiración rápida y entrecortada, y profusa transpiración.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

TODO EL PAÍS:

- **TAS** Centro de Consultas Toxicológicas **0800-888 -8694**

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

- Hospital de Clínicas - Facultad de Medicina (UBA). Dpto. de Toxicología. Tel: (011) 5950-8000 (Conmutador) / (011) 5950-8804 (Área de toxicología).
- Hospital Pedro de Elizalde. Tel: (011) 4300-2115 / 4307-5842/44
- Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Unidad de Toxicología. Tel: (011) 4962-6666/2247

PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

- Hospital Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). Tel: (011) 4658-7777 / 4654-6648
- Hospital de Niños Sor María Ludovica (La Plata). Tel: (0221) 451- 5555 / 453-5901 y 0800-222-9911 (las 24 hs).

PROVINCIA DE CÓRDOBA:

- Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400
- Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200

PROVINCIA DE SANTA FÉ:

- Servicio de Toxicología, Sanatorio de Niños. (Rosario) Tel: 0341-448-0202 (24 hs)

PROVINCIA DEL CHACO:

- Hospital Dr. Julio C. Perrando (Resistencia). Tel: (03722) 42-5050 / 42-7233.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se espera potenciación, sinergismo ni aditividad con los productos con los que se recomienda su mezcla.

GENERALIDADES:

Ligate® Besty Pack es un herbicida de uso agrícola, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en Barbechos Químicos de lotes destinados a variedades de soja identificadas como **Ligate® STS®** (tolerantes a **Ligate®**). Tiene además actividad residual que permite el control de muchas malezas que germinan después del tratamiento.

El producto una vez aplicado es absorbido principalmente por las raíces durante la emergencia de las plantas, y por raíces y follaje en plantas ya emergidas, traslocándose a las zonas de activo crecimiento, e inhibiendo el desarrollo de las malezas susceptibles. Luego de la aplicación las plantas sensibles se tornan cloróticas y los puntos de crecimiento mueren, en un período de una a tres semanas dependiendo de las condiciones ambientales y grado de susceptibilidad de las malezas.

La efectividad del producto es máxima cuando se aplica en pre-emergencia de las malezas o sobre plantas pequeñas, en activo crecimiento y cuando siguen al tratamiento buenas condiciones de humedad y temperatura. El grado de control y duración del efecto dependen del espectro, tamaño y densidad de las malezas. Además, influyen textura y propiedades físicas y químicas del suelo, cantidad de lluvia caída, cobertura del suelo y condiciones ambientales previas y posteriores a la aplicación.

Ligate® Besty Pack debe ser aplicado en mezcla de tanque con glifosato para el control de las malezas presentes al momento del tratamiento.

Ligate® Besty Pack comenzará a mostrar su acción herbicida residual una vez que haya ingresado e incorporado a la solución del suelo. Para ello es necesaria la ocurrencia un evento de lluvias de entre 20-25 mm. Luego de la incorporación del producto, el perfil del suelo deberá presentar humedad suficiente para que el herbicida permanezca en la solución del suelo y pueda ser absorbido por las raíces de las malezas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Ligate® Besty Pack se presenta formulado como gránulos dispersables, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado.

En el caso de aplicaciones con malezas ya emergidas se recomienda el agregado de un surfactante no iónico para mejorar la absorción vía foliar del producto.

Ligate® Besty Pack debe prepararse como se explica seguidamente:

1. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia, filtrada, hasta la mitad de su capacidad y poner en marcha el agitador del equipo.
2. Agregar la cantidad requerida de ambos componentes del pack según dosis de uso y superficie a tratar. Esperar a que el producto esté completamente disperso antes continuar con la preparación.
3. A continuación, incorporar el glifosato, de acuerdo a la dosis de uso según formulación y superficie a tratar. Esperar a que el producto esté completamente disperso antes continuar con la preparación.
4. Agregar surfactante en caso de ser necesario.
5. Completar la carga de agua del tanque, y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la total homogeneidad del preparado.

Importante: Respetar el orden de preparación indicado. Preparar únicamente el producto estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Ligate® Besty Pack puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado, o con una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Deberán emplearse pastillas de abanico plano.

Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua, sobre el mismo terreno en que se va a utilizar.

Número de gotas: el volumen y la presión de aplicación deberá adecuarse para lograr un buen mojado de las malezas (30-40 gotas / cm², gotas de 300 a 500 micrones).

Manejo de la deriva

Evitar la deriva de la neblina de pulverización. El potencial de deriva aumenta cuanto mayor es la velocidad del viento, y también cuando se dan condiciones muy calmas (por inversión térmica). Asimismo, cuando las condiciones ambientales al momento de la aplicación son de altas temperatura y baja humedad relativa se facilita la deriva. Las medidas elementales para minimizar este efecto son: procurar no aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h. o inferiores a 3 km/h. (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación (mínima altura que permita una pulverización uniforme) y pulverizar gotas de gran diámetro (≥ 200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

LAVADO DE EQUIPOS:

Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación realizando un triple lavado: En cada uno de los lavados llenar el tanque un 25% de su capacidad con agua limpia y hacer circular la solución por todo el sistema durante 15 min (en caso de utilizar agentes limpiadores, hacerlo siguiendo las indicaciones de su respectiva etiqueta). Retirar los picos y pastillas y lavarlos de forma individual.

Eliminar el caldo en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas, sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas, ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos.

Es importante que esta tarea se lleve a cabo para evitar el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible.

RECOMENDACIONES DE USO

Ligate® Besty Pack puede aplicarse desde 30-45 días antes de la siembra de lotes destinados siempre a la siembra de variedades de soja identificadas como **Ligate® STS®** (Tolerantes a **Ligate®**). También puede aplicarse en pre-siembra de lotes de soja variedades **Ligate® STS®** (desde los 7-10 días previos hasta el momento de la siembra, para el control de malezas primavera-estivales). Las aplicaciones deben realizarse en mezcla con glifosato a la dosis indicada según formulación para este tipo de uso en todos los lotes con malezas presentes al momento de la aplicación.

Consultar las etiquetas correspondientes de los componentes de este pack, Ligate (Reg. SENASA 36831) y Capaz (Reg. SENASA 32958) para ampliar las instrucciones de uso de la presente etiqueta.

Uso	Malezas Controladas	Dosis de Uso (a)	Momento de aplicación
<p>Barbecho</p> <p>Químico</p> <p>y</p> <p>Pre-siembra</p> <p>de Soja</p> <p>Ligate® STS®</p>	<p>Hoja Ancha Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>) Anagallis (<i>Anagallis arvensis</i>) Altamisa colorada (<i>Descurainia argentina</i>) Apio cimarrón (<i>Ammi majus</i>) Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa pastoris</i>) (1) Borreria (Borreria sp. = Spermacece sp.) Caapiquí (<i>Stelaria media</i>) Cardo (<i>Carduus acanthoides</i>) Cerraja (<i>Sonchus sp.</i>) Flor de la noche (<i>Oenothera indecora</i>) (1) Gomphrena (Gomphrena sp.) Malva Blanca (<i>Sphaeralcea bonariensis</i>) Manzanilla (<i>Anthemis cotula</i>) Marcela (<i>Gnaphalium cheirantifolium</i>) Mastuerzo (<i>Coronopus didymus</i>) Parietaria/ocucha (<i>Parietaria debilis</i>)(*) Ortiga (<i>Urtica urens</i>) Ortiga mansa (<i>Lamium amplexicaule</i>) Peludilla (<i>Gamochaeta spicata</i>) Pensamiento silvestre (<i>Viola arvensis</i>)(**) Perejilillo (<i>Bowlesia incana</i>) Rama negra (<i>Conyza sp</i>)(***) Quínoa (<i>Chenopodium album</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)</p>	<p>90 – 100 g/ha Componente A (Ligate®) + 270 – 300 g/ha Componente B (Capaz®) + Glifosato (dosis según formulación para este tipo de uso)</p> <p>Utilizar las dosis mayores (Ligate 100 g/ha + Capaz 300 g/ha) en suelos pesados (b) y/o con alta materia orgánica.</p> <p>En suelos medianos, con MO > 2%, franco y franco-limosos se recomiendan las dosis menores de ambos componentes (Ligate 90 g/ha + Capaz 270 g/ha).</p>	<p>Barbecho Químico Corto: Aplicaciones hasta 30 - 45 días antes de la siembra.</p> <p>Pre-Siembra: Aplicaciones desde 7-10 días previos hasta la siembra.</p>

<p>Yuyo colorado (<i>Amaranthus quitensis/Amaranthus palmeri</i>) (****)</p> <p>Gramíneas Anuales</p> <p>Urochloa (<i>Urochloa plantaginea</i>)</p> <p>Capín (<i>Echinochloa crus galli; E. colonum</i>)</p> <p>Chloris (Chloris sp.)</p> <p>Eleusine (<i>Eleusine indica</i>)</p> <p>Maíz guacho (<i>Zea mays</i>)(*****)</p> <p>Rye Grass (<i>Lolium multiflorum</i>)</p> <p>Pasto Cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>)</p> <p>(1) Pappophorum (<i>Pappophorum sp.</i>)</p> <p>Roseta (<i>Cenchrus pausiflorus</i>)</p>		
--	--	--

- (a) Dosis y recomendaciones de uso de ambos componentes en conjunto. El uso individual de los componentes debe realizarse de acuerdo a las dosis y recomendaciones detalladas en sus respectivas etiquetas.
- (b) Suelos arcillosos o arcillo limosos o contenidos de materia orgánica superiores a 3%. Referir a la etiqueta de los componentes para mayores detalles.
- (*) Puede tener control parcial, dependiendo de las condiciones ambientales previas a la aplicación, estado de la maleza (emergida o no emergida), tipo de suelo, rastrojo, etc.
- (**) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida, en estado de roseta de hasta 5-10 cm de diámetro, previo al estado de floración.
- (***) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.
- (****) Aplicar estrictamente antes de la emergencia. En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- (*****) Control pre-emergente de individuos provenientes de semillas dispersas.

(1) Malezas sujetas a aprobación de ampliación de uso al Pack.

Los ensayos de eficacia en el control de malezas fueron realizados con aplicaciones de **Ligate® Besty Pack** en suelos no laboreados.

Máximo número de aplicaciones: No realizar más de una aplicación por año.

Importante:

Tamaño de Maleza: Aplicar preferentemente en pre-emergencia de la maleza o con maleza emergida pequeña en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo, en el caso de latifoliadas, o 2-3 hojas en el caso de gramíneas). Cuando las malezas presentes en el lote

superen el tamaño indicado se debe realizar una aplicación previa con un producto de actividad por contacto.

En el caso específico de yuyo colorado la actividad del producto es solamente pre-emergente de la maleza. Por lo tanto, en lotes con yuyo colorado ya emergido se deberá realizar la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

En el caso de maíz guacho, el control es básicamente de preemergencia de individuos provenientes de semillas dispersas.

Condiciones ambientales: Aplicar con buenas condiciones de humedad que permitan el activo crecimiento de las malezas. No aplicar **Ligate® Besty Pack** cuando las malezas estén bajo situaciones de estrés tales como sequía, bajas temperaturas o heladas, baja fertilidad, etc. porque el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado.

En aplicaciones primaverales el período de control se extiende 40-60 días dependiendo también de las variables mencionadas anteriormente.

Advertencias

- No aplicar en otra circunstancia distinta de las expresamente indicadas en las recomendaciones de uso.
- En aplicaciones de preemergencia, luego de la emergencia del cultivo, no aplicar insecticidas órgano-fosforados por un lapso de 14 días desde la aplicación ya que el cultivo puede ser dañado.

RESTRICCIONES DE USO

Período de Carencia: exento (uso posicionado previo a la implantación del cultivo).

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

- No utilizar en lotes con suelos arenosos (conteniendo más de 50% de arena), y materia orgánica menor a 1%, cualquiera sea la rotación siguiente a la soja.
- No aplicar en suelos con pH superiores a 7 ya que el producto puede afectar a los cultivos que sigan en la rotación.

Tiempo de reingreso al área tratada: dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

Rotación de cultivos: **Ligate® Besty Pack** está destinado para el control de malezas en Barbechos Químicos de lotes que rotan exclusivamente con sojas tolerantes a **Ligate® STS®**. En la secuencia de rotación que sigue a la soja **Ligate® STS®** pueden sembrarse solamente los siguientes cultivos: trigo, cebada, avena, maíz, girasol, sorgo, soja. En cada caso deben observarse los siguientes períodos mínimos desde la aplicación de **Ligate® Besty Pack** y la siembra: trigo, cebada, avena, soja (7 meses), maíz, girasol, sorgo (11 meses).

Resiembras: En caso necesidad de resiembra en la soja siguiente a la aplicación de **Ligate® Besty Pack**, deberá utilizarse una variedad de soja **Ligate® STS®**.

MANEJO DE RESISTENCIA:

Ligate® Besty Pack es un herbicida que pertenece al grupo de sitio de acción **2** y **14** y a la familia química de las **Sulfonilureas** (Parte A) y a la familia química de las **N-Phenyl-triazolinones** (Parte B).

Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes se recomienda: Llegar a siembra con lotes limpios, respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación, número máximo de aplicaciones por ciclo) detalladas en el marbete, realizar rotación de herbicidas con diferentes sitios de acción durante el barbecho y a lo largo del ciclo del cultivo, realizar rotación de cultivos, limpiar adecuadamente las herramientas, maquinarias y vehículos, limpiar las áreas no cultivadas y monitorear periódicamente la evolución de las malezas en los lotes y sembrar semillas de buena calidad, de origen conocido y libre de propágulos de malezas.

COMPATIBILIDAD

Ligate® Besty Pack es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. **Ligate® Besty Pack** es compatible con glifosato en sus formulaciones más frecuentes.

Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados junto con **Ligate® Besty Pack** deben estar registrados para ese uso particular.

FITOTOXICIDAD

Ligate® Besty Pack no es fitotóxico para la soja **Ligate® STS®** a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

RESPONSABILIDAD LEGAL: Agro Corteva Argentina S.R.L. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.