

UNIVERSO

HORTIFRÚTI




Desafio no controle de pragas na cultura da batata

Principais pragas: lagartas, traça e minadora

Para a maioria das lagartas da parte aérea, não existe nível de controle definido na cultura. Mas o monitoramento se dá com a observação da presença de lagartas e ovos nas plantas. Para isso, deve-se ficar de olho, principalmente, em folhas, ponteiros e flores. Além das lagartas desfolhadoras, devemos ficar atentos à traça (*Phthorimaea operculella*) que ataca folhas e tubérculos.

Já com a mosca-minadora (*Liriomyza huidobrensis*), os danos são causados por larvas que abrem minas no interior do parênquima foliar e se alimentam dos tecidos.


A mosca-minadora, a traça e as lagartas desfolhadoras, em geral, são de ocorrência mais frequente no período do **outono**, visto que atacam várias espécies de solanáceas silvestres e, nesse período, geralmente, há uma população local elevada, fazendo com que os adultos migrem para as áreas cultivadas procurando novas plantas para a oviposição.



Delegate:

amplo espectro e
controle incomparável.


- **Mercado de batata – dose de 80 a 120 g/ha para lagartas.**
- Posicionar antes do fechamento de linha, com 80 a 120 g/ha. Com 120 g/ha, já se obtém efeito um controle excelente para traça e minadora, mas é preciso lembrar que, para esses alvos, deve-se adicionar 0,03 v.v de espalhante adesivo.
- **Reaplicar o Delegate após o fechamento de linha, na dose de 120 g/ha, com adjuvante siliconado.**
- Evidenciar essa flexibilidade de dose faz do produto ferramenta para o manejo do produtor, deixando de ser o “socorro”.



Delegate:

amplo espectro e
controle incomparável.

- Tripes, traça, mosca-minadora – recomendação: 120 a 160g/ha.
- Lagartas – 80g a 120g/ha.
- VARIA COM O NÍVEL DE INFESTAÇÃO:
Controlar o início da infestação. Oportunidade de doses menores, sendo assim mais competitivos comercialmente e com controle muito superior ao da concorrência para o amplo espectro de pragas.
- **Desafio: ESTAR PRESENTE NA LAVOURA.**



Qual é o posicionamento de Delegate?

Tripes



120 a 160 g/ha

Lagartas
(Plusias, complexo de lagartas)



80 a 120 g/ha



Traças**




16 a 20 g/1000 L

Larvas
minadoras**



120 a 160 g/ha

**Adicionar 0,03% v/v de esp. adesivo.



LINHA HORTIFRÚTI
Proteção para todo o ciclo da lavoura.



CORTEVATM
agriscience

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br

TM® Marcas registradas da Corteva Agriscience e suas companhias afiliadas. © 2021 Corteva

ATENÇÃO PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.