

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUIMICO: Fosfanoglicina.

Durante la manipulación del producto, usar guantes, botas, protector facial y delantal. Durante la aplicación, usar guantes, botas, protector facial y delantal. No fumar, comer ni beber durante la manipulación y aplicación. No exponerse a la niebla de la aplicación. No aplicar con viento. Lavar toda la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavarse prolijamente y cambiarse de ropa después del trabajo. No contaminar aguas de regadío, agua potable, cursos de agua o ríos.

Almacenaje: Almacenar bajo llave, en lugar exclusivo para plaguicidas, ventilado, fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Mantener fuera del alcance de niños y personas no responsables. No almacenar en el mismo lugar con alimentos o semillas.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas pueden incluir: dolor de cabeza, mareos, debilidad, incoordinación, temblores musculares, calambres abdominales, diarrea y sudación, visión borrosa y edema pulmonar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **Inhalación:** Remover fuente de contaminación o mover a la víctima al aire libre. Mantener a la persona abrigada y en reposo. Tratar sintomáticamente. Obtener ayuda médica si es necesario. En caso de **contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de **Ingestión:** Enjuague la boca con agua. No inducir el vómito. Efectuar lavado gástrico, siempre que la víctima este conciente. Obtener ayuda médica de inmediato llevando la etiqueta del producto.

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Tratar sintomáticamente de acuerdo a la evolución del paciente. Enjuague la boca con agua. No inducir el vómito. Efectuar lavado gástrico, siempre que la víctima este conciente. Administre oxígeno si la respiración esta deprimida. Antídoto: No existe antídoto específico.

EN CASO DE INGESTION INTOXICACION LLAMAR AL (2) 635 3800
CONVENIO CITUC/AFIPA O AL (2) 247 36 00 CITUC QUIMICO,
FONO EMERGENCIA ATENCION LAS 24 HORAS. DOW AGROSCIENCES (2) 440 4800.

Panzer® Gold es de baja peligrosidad para aves, peces y abejas. **Panzer® Gold** se degrada en contacto con el suelo, sin afectar vida silvestre, ni cultivos posteriores.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Dow Dow AgroSciences

Herbicida

Panzer® Gold

HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Contenido por Envase (p/v)

Sal dimetilamina de Glifosato* 60,8%
Emulsificantes y coadyuvantes c.s.p. 100%

* N - (fosfonometil) glicina, sal DMA
(480 g/L de equivalente ácido)

Panzer® Gold es un herbicida sistémico de aplicación post emergencia, para el control total de malezas, anuales, bienales y perennes, en plantaciones forestales, huertos frutales, parronales y viñas, así como en cero labranza y regeneración de praderas, según lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3536

Número de lote o partida:

Fecha vencimiento, mes y año:

Nombre y dirección del fabricante: Dow AgroSciences Argentina S.A., Av. E. Madero 900, Piso 5 (C1106ACV), Buenos Aires, Argentina.

Nombre y dirección del importador: Dow AgroSciences Chile S.A., Américo Vespucio Sur 100, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.

Contenido neto: 20 LITROS

**NO INFLAMABLE – CORROSIVO AL FIERRO – NO EXPLOSIVO.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

* Marca registrada de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow / * Marca registrada de Dow AgroSciences



CUIDADO



002936949-06-17-Chi

Características y forma de acción del producto: Inhibe la síntesis de aminoácidos al inhibir la enzima EPSPS. Se detiene el crecimiento poco después de la aplicación, seguido por una clorosis foliar generalizada y una necrosis que varía entre 4 y 20 días dependiendo de la susceptibilidad de cada especie y de las condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Malezas	Dosis L/ha	Observaciones	Carencia días*
Almendros, Arándanos, Avellano europeo, Cerezos, Ciruelos, Clementinas, Damascos, Durazneros, Frambuesas, Kiwis, Limones, Mandarinos, Manzanos, Naranjos, Nectarines, Nogales, Olivos, Paltos, Perales, Pomelos, Tangerinas y vides.	Gramíneas anuales, ballicas, vulpia, hualcacho	1 a 1,5	Aplicar dirigido sólo al follaje de las malezas. Evitar el contacto de Panzer® Gold con cualquier parte verde de los cultivos, incluyendo el tronco en árboles jóvenes, cuya corteza no esté completamente lignificada.	N.C
	Hoja ancha anuales, yuyo, bleado, manzanilla, sanguinaria	1,5 - 3		
Pinos, eucaliptos, álamos.	Maicillo, pasto cebolla, chéptica gigante, falso té, correhuela, vinagrillo	2,2 - 3	Aplicar sobre malezas en crecimiento activo usando agua limpia, sin barro, que puede disminuir la efectividad del tratamiento.	
	Pasto bermuda, chufa	4,5 - 6	Usar dosis altas en situaciones de alta densidad.	
Barbecho químico, Regeneración de praderas.	Avenilla, chéptica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 a 3	Aplicar de pre plantación y/o en post plantación, evitando todo contacto o deriva sobre la plantación	N.C
	Aromos, quila, retamilla, retamo, maqui, ulex.	3 a 4,5		
	Avenilla, chéptica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 a 3	Esperar tres a siete días antes de mover el suelo, para permitir una completa translocación del producto	N.C

*Nota: N.C.: No corresponde.

PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **Panzer® Gold** necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. (100 – 200 L/ha).

COMPATIBILIDADES: En barbechos químicos, **Panzer® Gold** puede mezclarse con Terbutilazina, Starane® o Esterón® Ten Ten. También es compatible con atrazina, simazina, MCPA, Garlon® y Tordon® entre otros herbicidas. **Panzer® Gold** puede ser mezclado con Goal® 2EC para malezas de difícil control.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas de contacto. Aguas sucias con suelo en suspensión o materia orgánica pueden disminuir su eficacia.

FITOTOXICIDAD: Debe tomarse todas las precauciones para evitar deriva a cultivos cercanos para evitar daños a estos. Evite aplicar con viento.

NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES: Máximo 5 aplicaciones por temporada con al menos 45 días entre cada una de ellas.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 4 horas después de realizada la aplicación, para reingresar al área tratada.

APLICACIONES AEREAS:

Cultivo	Malezas	Dosis L/ha	Observaciones	Carencia días*
Pinos, eucaliptos, álamos.	Avenilla, chéptica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 a 3	Aplicar de pre plantación y/o en post plantación, evitando todo contacto o deriva sobre la plantación. Utilizar mojamientos de 30 – 60 L agua/ha.	N.C
	Aromos, quila, retamilla, retamo, maqui, ulex.	3 a 4,5		

En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas, esto puede ocurrir a Panzer® Gold como a otros herbicidas de su mismo grupo químico, a través de una mutación normal en cualquier población de malezas. En estos casos el uso repetido de este grupo de herbicidas puede llevar a estos biotipos de malezas a ser dominantes por lo que la población de malezas será de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **Panzer® Gold**, por lo que Dow AgroSciences no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas malezas resistentes. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Dow AgroSciences garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

Mayo 2017