

TordonXT[™]

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTES ACTIVOS:

Aminopyralid.....	20 g/L
4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid. Equivalente a 24,37 g/L de sal dometilamina de aminopirialid.	
2,4-D	240 g/L
2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Equivalente a 289.2 g/L de sal dimetilamina 2,4 -D.	

INGREDIENTES ADITIVOS.....c.s.p 1 L

Registro Nacional ICA No. 1793

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Mamonal Km 14 Vía Cartagena
Cartagena, Bolívar - Colombia
Tel: (605) 693-2800

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401
Bogotá, Colombia.
Tel: (601) 259 5900

[™] ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.
© Corteva.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

TordonXT™

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

TordonXT™ es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.

La eficacia de **TordonXT™** en el control de malezas de hoja ancha incrementa la carga de pasto por potreros (ton/ha), lo cual repercute en mayor ganancia de peso y/o producción de leche y mayor rentabilidad para el ganadero.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	P.C.	P.R.
POTREROS	Algodoncillo <i>Peltaea speciosa</i>	1.5 L / 200 L (0.75% v/v) 3.0 L/ha*		
	Arruinarricos <i>Melochia parviflora</i>	1.5 - 2.0 L / 200 L (0.75 - 1.0 % v/v) 3.0 - 4.0 L/ha	7 días	0 horas
	Dormidera <i>Mimosa pudica</i>	1.0 - 1.5 L / 200 L (0.5 - 0.75% v/v) 2.0 - 3.0 L/ha*		
	Bicho o Chilinchil <i>Senna obtusifolia</i>	1.0 L / 200 L (0.5% v/v) 2.0 L/ha*		
	Bejuco lanoso <i>Centrosema pubescens</i>	1.0 L / 200 L (0.5% v/v) 2.0 L/ha*		
	Malva <i>Malachra alceifolia</i>	2.0 L / 200 L (1.0% v/v) 4.0 L/ha*		
	Escoba blanca <i>Sida rhombifolia</i>	**1.5 - 2.0 L / 200 L (0.75 - 1.0 % v/v) 3.0 - 4.0 L/ha* ***0.75 - 1.0 L / 200L (0.375 - 0.5% v/v) 1.5 - 2 L/ha*		

* En un volumen de agua de 400 L/ha.

** Para áreas densamente pobladas de malezas.

***Para áreas con malezas diseminadas en manchones.

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada.

RECOMENDACIONES DE PASTOREO

Se recomienda la labor de pastoreo y alimentación con heno en zonas no tratadas por 3 días, de lo contrario existe el riesgo de residuos del ingrediente activo en la orina y/o estiércol el cual puede causar daños a plantas sensibles de hoja ancha.



TordonXT[™]

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Utilice la dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote.

Aplicar cuando las malezas tengan una altura entre 30 - 80 cm.

Aplicar teniendo en cuenta la infestación de malezas en el potrero.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

En aplicación terrestre en potreros, **TordonXT[™]** se debe aplicar mediante aspersión directa a las malezas, utilizando aspersora manual de mochila, o si hay posibilidad, usando equipo de aspersión acoplado al tractor. Para la aplicación por aspersora manual, hay que preparar la mezcla, llenando el tanque de aplicación con agua hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen y comenzando a agitar; luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua. El volumen de agua recomendado es de mínimo 400 litros por hectárea para aplicaciones totales.

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

- No aplique **TordonXT[™]** en potreros que se vayan a rotar inmediatamente con cultivos de hoja ancha tales como soya, algodón u otros.
- No utilice estiércol de ganado alimentado en potreros tratados con **TordonXT[™]**, como fertilizante o enmienda.
- No aplique en áreas cercanas a cultivos susceptibles (hoja ancha).
- No aplique **TordonXT[™]** vía aérea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



TordonXT[™]

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.**
- **EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR ALERGIAS EN CIERTAS PERSONAS.**

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre cultivos susceptibles.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Evite contaminar con **TordonXT[™]** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

“Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 22/07/2022

