

Kyventiq[™]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Fenpicoxamid **130 g/L**
(2-(((3R, 7R, 8R, 9S)-7-benzyl-9-methyl-8-(2-methylpropanoyloxy)-2,6-dioxo-1,5-dioxonan-3-yl) carbamoyl)-4-methoxypyridin-3-yl)oxymethyl-2-methylpropanoate, de formulación a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 L**

Registro Nacional ICA No. 2232

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience France S.A.S.
82, rue de Witteisheim. Cernay Cedex - Francia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401, Bogotá, Colombia.
Tel (601) 259 59 00

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.

© Corteva

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Kyventiq™

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

Kyventiq™ penetra dentro de las hojas en forma translaminar, evidenciando una movilidad local dentro de la planta. Es el primer miembro de una nueva clase de fungicidas; las picolinamidas. Es un inhibidor interno de la Quinona (Qil). **Kyventiq™** inhibe la respiración mitocondrial en el hongo.

Kyventiq™ actúa en un sitio diferente al sitio en que actúan las SDHI's y las estrobirulinas (Qol).

Kyventiq™ debe ser aplicado en forma preventiva cuando las condiciones ambientales sean óptimas para el desarrollo de la enfermedad.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
BANANO	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	385 ml/ha	0 días	4 horas

P.C. Período de Carencia: intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de re-entrada: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Para el control de Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*), aplicar **Kyventiq™** usando la dosis recomendada (385 ml/ha). Se recomienda usar **Kyventiq™** tres veces por año dentro de un programa de rotación de productos para el manejo de esta enfermedad.

Se recomienda la adición de un aceite mineral y un emulsificante para mejorar la eficacia del producto.

Kyventiq™ debe ser utilizado como Fungicida preventivo en los primeros estadios de desarrollo de la enfermedad.

MANEJO DE RESISTENCIA

- **Kyventiq™** contiene el ingrediente activo Fenpicoxamid (GRUPO FRAC 21).
- No se recomienda usar únicamente **Kyventiq™** u otros fungicidas de los GRUPOS 21 para controlar la misma enfermedad durante toda la temporada.
- Se recomienda rotar y/o mezclar con productos que tengan diferentes modos de acción MoA o limitar el número total de aplicaciones por temporada.
- No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado.
- Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fungicidas. **Kyventiq™** no debe alternarse o ser mezclado con cualquier fungicida al que ya se haya desarrollado resistencia contra Sigatoka Negra en la región donde se aplicará.



KyventiqTM

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

KyventiqTM no muestra efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones de uso plasmadas en la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Kyventiq[™]

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas dependiendo del cultivo”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 09/06/2023

