



Equation[®] Pro

FUNGICIDA

¿Qué es Equation[®]PRO?

Equation[®]PRO es un fungicida sistémico local formulado en gránulos dispersables (WG); para ser mezclado con agua y aplicado en forma de aspersión foliar para el control del tizón tardío "gota" en los cultivos de papa y tomate, "Mildiu" en el cultivo de uva y "Mildiu veloso" en el cultivo de cebolla.

Formulado como una mezcla de dos ingredientes activos de diferente acción, **Equation[®]PRO** actúa como fungicida protectante y curativo en los estados iniciales de desarrollo de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad a controlar	Dosis	P.C.	P.R.
Papa	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	600 g/ha	7 días	4 horas
Tomate		500 g/ha	7 días	
Cebolla	Mildiu veloso (<i>Peronospora destructor</i>)	600 g/ha	7 días	
Vid	Mildiu Velloso (<i>Plasmopara viticola</i>)	400 g/ha	28 días	

P.C. Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P. R. Periodo de Reingreso: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área de cultivo tratado. Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección requerido para la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Papa y tomate: Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo, cuando las condiciones sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Utilice un intervalo de aplicación promedio de siete (7) días entre estas. Utilice un volumen de aplicación promedio de 200 a 400 L/ha en plantas pequeñas y 400 a 600 L/ha en plantas grandes.

Cebolla: Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo, cuando las condiciones sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Utilice un intervalo de aplicación promedio de siete (7) días entre estas. Utilice un volumen de aplicación promedio de 200 a 400 L/ha en plantas pequeñas y 400 a 600 L/ha en plantas grandes. Se recomienda la adición de un adyuvante con registro en el cultivo de cebolla, con el fin de mejorar la adherencia y dispersión del producto, debido a la estructura de la planta de cebolla.

Uva: Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo. Aplicar a partir de los 20 días después de la poda cada 7 días. El intervalo entre las aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión del patógeno, estado de desarrollo y variedad el cultivo.



Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Corteva Agriscience de Colombia S.A.S Tel: (601) 2595900 / Bogotá - Colombia / Reg. Nac. ICA PL0017002023 - Cat. Tox. III - Franja Azul - Ligeramente peligroso - Cuidado. / EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 horas. Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 en Bogotá (601) 2886012 - (601) 9191919.