

Amylo-X[®]

FUNGICIDA PARA EL MANEJO DE OIDIO EN EL CULTIVO DE ROSA

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO

Suspensión Concentrada (SC)

USO AGRÍCOLA

CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Composición	
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> strain D 747	1*1010CFU/ml
Pureza	100%
Aditivos c.s.p.	1 l.

Registro Nacional: 001-002/ACB

TITULAR DE REGISTRO:



Corteve Agriscience de Ecuador S.A.
Av. 6 de Diciembre 2816 y Paúl Rivet.
Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10.

Importado y Distribuido por:

FORMULADO POR:



CERTIS USA LLC.
9145 Guilford Road Suite 175
Columbia, MD 21046, USA
Teléfono: (301) 604-7340



Amylo-X[®]

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Bacillus amyloliquefaciens strain D 747 coloniza en las hojas y raicillas de las plantas, evitando el establecimiento de hongos y bacterias causantes de enfermedades. Actúa por contacto.

MODO DE EMPLEO:

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de AMYLO-X, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	Dosis	PC
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Oidio (<i>Oidium</i> sp.)	1.25 cc/L	N/A

*PC= Periodo de carencia

VOLUMEN DE AGUA: 1800 litros/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Amylo-x se aplica por 3 ocasiones, una cada 7 días, en el cultivo de Rosa en la etapa fenológica de producción con un umbral económico del 6-7 % de incidencia.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos Fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD:

Evite mezclar con otros productos. Se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla. Incompatible con bactericidas.

RESPONSABILIDAD:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas y microbiológicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



Amylo-X[®]

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón”.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación. Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel. Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos. Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca al vómito.

Síntomas: Los síntomas agudos pueden causar irritación al contacto de la piel además enrojecimiento y lagrimeo en contacto con los ojos. Al ser ingerido puede causar irritación y malestar en el aparato digestivo, dolor abdominal, diarrea, irritación de vías respiratorias.

Tratamientos: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

“En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.”



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24
horas del día. CISPROQUIM 1800593005
Corteva Agriscience de Ecuador S.A.
2223 2720. Ext 114**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente.

- “Baja toxicidad para peces, daphnias, algas, aves, abejas y artrópodos”. “No contaminar lagos, ríos, estanques y arroyos, tanto al efectuar las aplicaciones como al lavar los equipos de aspersión o al eliminar los residuos”.
- **Fumigación terrestre:** “Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

