



CloserPRO™ 24 SC

INSECTICIDA

PRODUCE CAMBIO



DIFERENTE
MECANISMO
DE ACCION



NUEVA
OPCION DE
ROTACION



PROTEGE
POR MÁS
TIEMPO



CORTO
INTERVALO A
COSECHA



RESULTADOS
RÁPIDOS Y
CONTINENTES

¿Qué es CloserPRO™ 24 SC ?

CloserPRO™ 24 SC, insecticida sistémico que se trasloca en la planta hacia los brotes nuevos a través del xilema.

CloserPRO™ 24 SC, a base de Isoclast™ Active que fue descubierto y es propiedad de Corteva Agriscience, es el único miembro de una nueva clase química de insecticidas, las sulfoximinas. Isoclast™ active ha sido desarrollado globalmente para su uso en cultivos de importancia económica como algodón, hortalizas, manzanas, soya, arroz (fuera de los E.U.A.), cereales, crucíferas, cítricos, uvas, entre otros. Isoclast™ Active controla insectos chupadores que son plagas de importancia económica y difíciles de controlar, incluyendo muchas especies de mosca blanca, áfidos, chinches, chicharrita (saltahojas), cochinillas, algunas especies de psíidos y escamas. **CloserPRO™ 24 SC** ofrece un rápido efecto sobre las plagas y una prolongada eficacia residual.

CloserPRO™ 24 SC, tiene interacciones únicas y complejas con los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) en los insectos, que son distintas a las observadas con los neonicotinoides.

RECOMENDACIONES DE USO

Realizar un máximo de tres aplicaciones de **CloserPRO™ 24 SC** por ciclo de cultivo, en rotación con insecticidas de diferente mecanismo de acción. La primera aplicación se debe realizar al momento del apareamiento de la plaga, especialmente por migración. Realizar aplicaciones adicionales en caso de que haya reinfestación de la plaga.

Se sugiere utilizar un adyuvante no iónico con características de dispersión y penetración a la dosis recomendada por el fabricante. El volumen de aplicación puede oscilar entre 300 y 600 litros por hectárea, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo. Use un volumen de aplicación que permita una adecuada cobertura del foliaje.

CloserPRO™ 24 SC, actúa sobre inmaduros y adultos para muchos insectos plagas para lo cual está recomendado y su aplicación debe ser dirigido al apareamiento de la misma.

CULTIVOS, PLAGAS Y DOSIS RECOMENDADAS

Cultivo	Plaga	Dosis
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> o <i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	400 cc/ha
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	300-400 cc/ha
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	300-400 cc/ha
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	400 cc/ha
	Pulgones / Áfidos (<i>Aphis gossypii</i> / <i>Myzus persicae</i>)	50-100 cc/ha
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	150-200 cc/ha
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Pulgones / Áfidos (<i>Aphis gossypii</i> / <i>Myzus persicae</i>)	50-100 cc/ha
Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	Pulgones / Áfidos (<i>Aphis gossypii</i> / <i>Myzus persicae</i>)	50-100 cc/ha
	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	300-400 cc/ha
Cítricos (<i>Citrus spp.</i>)	Dragón Amarillo (<i>Diaphorina citri</i>)	100 cc/ha



- CONTACTO
- INGESTIÓN

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar preferiblemente al observar los primeros insectos en el campo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Mantener un intervalo de 7 a 12 días entre aplicaciones, dependiendo del nivel de infestación. Rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para los cultivos de melón, papa, tomate, pepino, sandía y cítricos es de 1 día; para frijol 7 días, y para arroz 14 días.

PERÍODO PARA INGRESAR AL CAMPO TRATADO:

24 horas.

SELECTIVIDAD AL CULTIVO:

CloserPRO™ 24 SC no causa ningún efecto a los cultivos en donde se recomienda su uso, si se siguen las instrucciones establecidas para su aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No presenta problemas de compatibilidad si se mezcla con insecticidas o fungicidas tradicionalmente usados en los cultivos recomendados. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas de compatibilidad previas.



Categoría Toxicológica III – Franja azul
Ligeramente Peligroso – Cuidado.

País: Rep. Dominicana

No. Registro: 4528

Teléfonos de Emergencia:

· República Dominicana: (809) 684 3478 / 3672 – (809) 681 7828.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.