

# TordonXT™

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

<b>Aminopyralid</b> .....	<b>20 g/l</b>
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid. Equivalente a <b>24.37 g/L</b> de sal dimetilamina de aminopyralid.	
<b>2,4-D</b> .....	<b>240 g/l</b>
2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Equivalente a <b>289.2 g/L</b> de sal dimetilamina de 2,4-D.	
Polydimethylsiloxane .....	0.05 g/l
Ethylenediamine tetraacetic acid .....	2.18 g/l
<b>Aditivos</b> .....	<b>c.s.p 1 l</b>

Registro Nacional No.: 127- H3/NA

Titular del Registro:

**CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A.**

Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10. Quito, Ecuador.

FORMULADO POR:



**Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.**

Km 14 Vía Mamonal.  
Cartagena, Bolivar - Colombia.  
Conmutador: (605) 693 2800

DISTRIBUIDO POR:



El compadre del agro

**FarmAgro S.A.**

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7, Junto a Sal del  
Pacífico, Manzana 263, Parque Industrial Los Vergeles  
Guayaquil, Tel: 04.2590600

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience  
y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

**CUIDADO**

# TordonXT™

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**TordonXT™** es un herbicida a base de 2,4-D y Aminopyralid recomendado para el control de malezas de hoja ancha. Dicho herbicida bloquea el proceso normal de crecimiento, lo cual conlleva a la pérdida de la función de las raíces, bloqueo del floema, inhibición de la fotosíntesis y finalmente la muerte. 2,4-D es un herbicida sistémico, produce un acelerado crecimiento que impide la diferenciación celular, aparte de interferir con el metabolismo general de la planta, provocando así la muerte de las especies susceptibles.

## MODO DE EMPLEO

**TordonXT™** está formulado para ser aplicado directamente en el campo como aspersion, mezclado con agua como vehículo de transporte. Agitar fuertemente el envase del producto antes de abrirlo, llenar luego el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y luego agregar la dosis requerida. Luego añadir el resto del agua bajo constante agitación. La uniformidad en la mezcla es esencial.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Dosis	PC
Pasto Saboya ( <i>Panicum maximum</i> )	Escoba ( <i>Sida acuta</i> )	4.0 l/ha	7 días
	Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> ) Malva ( <i>Urena lobata</i> )	3.0 l/ha	7 días
	Frijolillo ( <i>Senna obtusifolia</i> )	2.0 l/ha	7 días

P.C: Período de carencia.

## VOLUMEN DE AGUA:

Frijolillo: 300l de agua por hectárea. Escoba: 400l de agua por hectárea. Dormidera y Malva: 600l de agua por hectárea.

## ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Realizar 1 aplicación por ciclo de pastoreo. Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, antes de su floración. No se debe aplicar sobre maleza que haya sufrido estrés por falta de humedad o por alguna otra causa. Realizar 1 aplicación.

## PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

## COMPATIBILIDAD:

Se recomienda no mezclar con productos ácidos y bases fuertes.



# TordonXT<sup>™</sup>

**FITOXICIDAD:**

El producto no produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado utilizándose de acuerdo a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD:**

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**



# TordonXT™

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Peligroso si es inhalado. Causa Irritación moderada a los ojos. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Evite el contacto con la piel y la ropa. Nocivo en caso de ingestión. Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.

## **MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:**

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

## **“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

## **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:**

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## **MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión**, no induzca al vómito.

**En caso de inconsciencia:** No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. **CONSULTAR CON UN MÉDICO.**

**Tratamiento:** Ejecutar tratamiento basado en el criterio del médico en respuesta a las reacciones del paciente.

**Sintomatología:** El contacto repetido puede causar irritación leve de la piel e irritación moderada en los ojos. Puede irritar el tracto respiratorio superior (nariz y garganta).

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:  
1800 VENENO (836366) Atención las 24  
horas del día. CISPROQUIM 1800593005  
CORTEVA AGRISCIENCE ECUADOR S.A.  
02223 2720. Ext 114.**

## **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

## **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la aplicación de **TordonXT™** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

