

Prosan™ 250 CE

FUNGICIDA

 **RED DE CUSTODIA** Conozca más de nuestro programa en: [www.reddecustodia.com](http://www.reddecustodia.com)  
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO



Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0333-306-009-026

Banda Precautoria: Azul

Categoría toxicológica: 4

Titular del registro: CORTEVA MX, S.A. DE C.V.

*Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.*

***Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.***



**Prosan™ 250 CE**

FUNGICIDA

**CON TODA LA  
FUERZA DEL  
PROPICONAZOL.**

Es un fungicida sistémico que ofrece acción protectante y curativa. Prosan™ 250 CE está formulado como concentrado emulsionable con 250 g i.a. (propiconazol) por litro.

Prosan™ 250 CE es rápidamente absorbido por las hojas y transportado hacia los brotes nuevos. Actúa dentro la planta, controlando al patógeno desde la primera fase de desarrollo de la enfermedad, por esto, aunque su modo de acción permite un uso protectante y curativo, los mejores resultados se obtienen si Prosan™ 250 CE es aplicado cuando la enfermedad está en sus primeros estadios de desarrollo.

### BENEFICIOS

Prosan™ 250 CE se trasloca rápidamente después de haber sido aplicado, esto evita la pérdida del producto e incrementa su acción curativa y preventiva logrando permanecer más tiempo dentro de las plantas, esta rápida acción permite un control ideal en los momentos de mayor presión del patógeno.

### RECOMENDACIONES:

#### PROSAN™250 CE EN EMULSIÓN DE AGUA Y DE ACEITE



1. Vacíe la dosis de aceite (citrolina agrícola) en un recipiente.
2. Adicione el emulsificante y Prosan™ 250 CE.
3. Agite bien durante 5 minutos.
4. Adicione la cantidad requerida de agua.
5. Agite bien durante 15 minutos.



#### PROSAN™250 CE EN ACEITE

1. Vacíe la dosis de aceite (citrolina agrícola ) en un recipiente.
2. Agregue la dosis de Prosan™ 250 CE.
3. Agite bien durante 5 minutos.

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Plátano (SL)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	0.4-0.5 L/ha Adicionar 5 L de citrolina agrícola/ha	Realizar de 6-8 aplicaciones máximo por temporada en 2 bloques de 3-4 aplicaciones, seguidas c/21 días intercalando 2 aplicaciones de productos de diferente modo de aplicación entre los 2 bloques. También pueden hacerse 3 bloques de 2-3 aplicaciones c/u intercalados con otros productos. Al cambiar de Prosan™ 250 CE a un producto de contacto, el intervalo será de 7 días; y al cambiar el de contacto a Prosan™ 250 CE , el intervalo será de 18-21 días.
Trigo Avena, Cebada, Centeno, Mijo (SL)	Roya lineal ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Roya de la hoja del trigo ( <i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>tritici</i> )	300-500 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones cada 14 días, cuando se detecten las condiciones óptimas para la aparición de la enfermedad y/o al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aspersion 350 L/ha.

Tiempo de re-entrada: 12 horas. ( ) Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha. (SL) SIN LIMITE.