
Un SuperGanadero aumenta su productividad





Este producto es selectivo a pastos. Siempre respeta el intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y el reingreso del ganado.

Beneficios que ofrecemos

- 1. Asesoría técnica especializada
- 2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
- 3. Programa de préstamo de equipos de aplicación
- 4. Capacitaciones continuas



















gistro sanitario: x5CO-MEZC-1255-301-034-072 nda Precaución tegoría toxicológica: 5 ular del registro: CORTEVA MX, S. A. de C. V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.





El más activo y sólido eliminador de malezas. Su presentación incluye dosificador.













HERBICIDA

SuperConcentrado: único y práctico contra las malezas.

Prado™ es el herbicida para controlar maleza herbácea, semileñosa y leñosa que invade las praderas limitando la productividad. Es una alternativa distinta ya que es el único herbicida sólido de alta concentración en el mercado.

Prado™ no necesita de mezclas; en cada gránulo contiene dos ingredientes activos. **Prado**™ se disuelve fácilmente en agua y no se sedimenta en los equipos de aplicación. No produce olores y es de baja volatilidad.



Después





Preparación de Prado™

Medir la cantidad de producto de acuerdo al tamaño de la mochila



Colocar la mitad de agua en la mochila y vaciar el producto



Tapar la mochila y agitar



Completar el volumen de agua en la mochila

Tipos de aplicación





Dosis para Tronadora (Wissadula amplissima) Para mayor información consultar la etiqueta del producto, en ambas aplicaciones usar un coadyuvante no iónico.

Foliar total

Se utiliza cuando el potrero tiene más del 60% cubierto de maleza. Utilizar cualquier equipo que haga una distribución uniforme del producto y que moje perfectamente toda la maleza.

Dosis: Utilizar de 3 a 5 piezas de Prado™ por hectárea en un volumen de 300 – 500 litros de agua*.

Foliar en manchoneo

Tras localizar la maleza, aplicar en manchoneo directamente sobre ella. Utilizar la mochila aspersora de espalda. Se utiliza cuando el potrero tiene menos del 50% cubierto de maleza.

Dosis: Utilizar 1 pieza de Prado™ para 100 litros de agua*.

Mochila de 15 litros: 12 gramos de Prado™

Por mochila aspersora corresponde a:

Mochila de 20 litros: 15 gramos de Prado™

Beneficios de usar Prado™





Fácil manejo

Prado™ es un producto concentrado, el envase tiene un dosificador que facilita su manejo y utilización, para usar la cantidad correcta por bomba de mochila.



- Tecnología probada
- Más productividad
- Mejores resultados



Aplicación confortable Prado™ no genera olor en la

Prado™ no genera olor en la mezcla, ni deja mal olor en la ropa.

Principales malezas que controla Prado™









Acahual o Flor amarilla (Baltimora recta)

Zarza de Playa (Mimosa pigra)

Hediondilla o Frijolillo (Senna obtusifolia)


Zarza de Loma (Mimosa albida)

Tronadora (Wissadula amplissima

Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería™.



Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones, con un distribuidor o en la App de Súper Ganadería"; para conocer cuál es la mejor solución para controlarla.



Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.



Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.



Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchoneo o al tocón. Siempre usar el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).

5 COLITYAL

Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpia posible.



Asegurarse de aplicar sobre toda la maleza, mojando "a punto de goteo" todas las hojas.



Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.



Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.