



Absolute™ 60 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Spinetoram 60 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 206-SENASA

Titular del Registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú.

FORMULADO POR:



Corteva Agriscience LLC.
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268. EEUU.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR



Farmex S.A.
Calle Dean Valdivia 148 piso 7. San Isidro,
Lima 27 - PERÚ. Tel: (01) 630-6400
Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® ™ Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.
© Corteva.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Absolute™ 60 SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Absolute™ 60 SC es un insecticida neurotóxico con el mismo mecanismo de acción del Spinosad, actúa por contacto e ingestión. El producto causa síntomas de excitación estimulando la actividad del sistema nervioso central (CNS) de los insectos. Aplicar **Absolute™ 60 SC** siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de infestación y el daño generado en el cultivo. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese **Absolute™ 60 SC** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Absolute™ 60 SC** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Brócoli	Plutella	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	1	0.05
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.3	1	0.10
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	60	0.04
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075 - 0.1	1	0.04
Pimiento	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	1	0.4
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.3	7	0.50
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	60	0.04
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.3	3	0.05
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	2	0.3
Algodón	Gusano bellotero	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	28	1.5
Arándanos	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	3	0.04
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.3	1	0.3
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	1	0.1
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	1	0.4
Granado	Polilla de la mazorca	<i>Tallula atramentalis</i>	0.3	1	0.3



Absolute™ 60 SC

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L / 200 L	%		
Holantao	Trips	<i>Thrip tabaci</i>	0.3	0.10	0.05	3	0.3

P.C. Período de Carencia.

L.M.R. Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

No efectuar más de tres aplicaciones por año. **Absolute™ 60 SC** se debe aplicar utilizando aspersora manual de mochila. Usar suficiente agua para asegurar un buen cubrimiento.

Holantao; se recomienda un volumen de agua de 600 l/ha suficiente para cubrir uniformemente el follaje de todas las plantas. Se sugiere la adición de un surfactante siliconado para mejorar la adherencia del producto al tejido de la planta, para lograr la mayor eficacia de control de **Absolute™ 60 SC**, especialmente en agroecosistemas de alta presión de trips, se sugiere una segunda aplicación cuando la población de estas se incrementa.

Manejo de Resistencia; - **Absolute™ 60 SC** contiene el ingrediente activo Spinetoram (GRUPO IRAC 5). - No se recomienda usar únicamente **Absolute™ 60 SC** u otros insecticidas del GRUPO 5 para controlar la misma plaga durante toda la temporada. - Evite exponer a generaciones consecutivas de una plaga el mismo modo de acción utilizando el enfoque de "ventana de aplicación" que rota productos de diferente modo de acción. - Las aplicaciones múltiples (no más de dos aspersiones consecutivas) del mismo modo de acción del insecticida son aceptables si se usan dentro de la misma ventana de aplicación o generación de la plaga. - No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. - Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las plagas. - **Absolute™ 60 SC** no debe alternarse o ser mezclado con cualquier insecticida al que ya se haya desarrollado resistencia.

PERIODO DE REINGRESO:

Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Absolute™ 60 SC no presenta incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD:

No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Absolute™ 60 SC

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**. No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico. **“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”**. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas. **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”**. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto. Después de hacer la aplicación lave los equipos sin verter los residuos en fuentes de agua. **Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado**. En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Spinosoides.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y abundantemente con agua por 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, y continúe con el lavado de los ojos. **PIEL:** Quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 15-20 minutos. **INGESTIÓN:** Dé a beber un vaso de agua si está en capacidad de deglutir. No induzca el

vómito a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico le indique hacerlo. Nunca dé cosa alguna por la boca a una persona inconsciente. **INHALACIÓN:** Traslade el paciente al aire fresco. Si la persona no respira, llame a un servicio de respuesta de emergencia o ambulancia, y administre respiración artificial; si es boca a boca utilice protección para rescatista (máscara de bolsillo etc.)

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106,
CISPROQUIM: 080-050-47
Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No permitir animales en el área tratada. Tóxico para abejas. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

