

COMBO[®] 60 WG/24 SL

HERBICIDA - SULFONILUREA, PIRIDINA
METSULFURON METHYL, PICLORAM

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

Composición química:

	p/p
Methyl 2 (((4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl)amino)sulfonyl)benzoate	60,00%
Ingredientes inertes	40,00%
Total	100,00%

Contiene: 600 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contiene: 6,67 gramos.

Composición química:

	p/v
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid	24,00%
Ingredientes inertes	89,20%
Total	113,20%

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contiene: 267 mL.

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: (Parte Líquida) 1,159 g/mL a 20°C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.



**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

FORMULADOR: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
A.A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Tel.: +(57) 605 693 2800

[™] [®] Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

COMBO[®] 60 WG/24 SL

USO AGRONÓMICO:

COMBO 60[®] WG/24 SL es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para el control de malezas de hoja ancha, leñosas, semileñosas y herbáceas presentes en los potreros.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un herbicida sistémico para el control selectivo de malezas de hoja ancha y/o perennes, el cual es extremadamente móvil en la planta. Se debe de considerar la acción de cada uno de sus ingredientes activos: el picloram interviene en el metabolismo de los ácidos nucleicos y afecta la respiración, fotosíntesis y la absorción de nutrientes, el metsulfuron-methyl inhibe algunos pasos de la biosíntesis de ciertos aminoácidos como valina, leucina e isoleucina. Se transloca basípeta y acropetalmente en la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación este en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto no es corrosivo. El tipo de boquilla es N° S S 8002.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- 1- Llene hasta la mitad el tanque de mezcla con agua.
- 2- Destape el envase.
- 3- Perforar el sello del compartimiento interior y verter el líquido en el agua.
- 4- Abrir la tapa del compartimiento interior y verter el líquido en el agua.
- 5- Agitar constantemente bien la mezcla para que la dilución y suspensión de los activos sea uniforme.
- 6- Adicionar el agua restante y agitar nuevamente.
- 7- Proceda a su aplicación.



INTERVALO DE APLICACIÓN:

Ver época de aplicación .

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y EL INGRESO DEL GANADO AL PASTO TRATADO:

Para animales lactantes dejar al menos 7 días, para animales no lactantes no hay restricción. Si el pasto será utilizado como alimento, esperar al menos 30 días antes de cosecharlo.

COMBO[®] 60 WG/24 SL

RECOMENDACIONES DE USO

PAÍS	CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Guatemala Honduras Costa Rica Nicaragua Panamá	Pastos Nombre científico del cultivo	Helecho macho <i>Pteridium aquilinum</i> Escobilla <i>Sida</i> spp. Legua de vaca <i>Clidemia</i> spp. Cinco negritos <i>Lantana camara</i> Chan de cabeza <i>Hyptis capitata</i> Dormilona <i>Mimosa pudica</i> Scoparia <i>Scoparia dulcis</i> Cyhatula <i>Cyhatula Postrata</i>	Aplicación total Malezas Herbáceas: 2 envases en 400 L/ha Malezas Leñosas: 4 envases en 400 L/ha Aplicación localizada (parches o focos) Malezas Herbáceas: 1 envase en 200 L/ha	COMBO 60[®] WG/24 SL puede ser aplicado en cualquier estado de desarrollo de cultivo. La maleza debe encontrarse en estado de crecimiento activo.
Nicaragua		Escobilla <i>Sida</i> spp. Dormilona <i>Mimosa pudica</i> <i>Melochia parvifolia</i> <i>Croton leptoschyus</i> <i>Clidemia rubra</i>	Malezas Leñosas: 2 envases en 200 L/ha	

REINGRESO PASTOREO:

20 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas, o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones dadas e la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con productos derivados del petróleo, aceite quemado. Por su formulación no se debe mezclar con otros plaguicidas.

COMBO[®] 60 WG/24 SL

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS .



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénesse bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, diarrea, visión borrosa y tos.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o

al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica.	(502) 2230-0807
	Centro de Intoxicaciones.	(502) 2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968

COMBO[®] 60 WG/24 SL

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA EL GANADO



TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Confinar el material derramado si es posible, absorber con materiales tales como: arcilla, barro, arena y barrer. Se deberá recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICEN LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición



de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
Guatemala	479-11
El Salvador	
Honduras	226-114-1
Nicaragua	DC-154-1-6-92
Costa Rica	3234
Panamá	1606