

## USOS DE LANNATE BR

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (L/HA)	PERIODOS DE CARENCIA (DIAS)		
ALGODON	Pulgón Trips <i>(Aphis gossypii)</i> <i>(Thrips tabaci)</i> <i>(Selenothrips rubrocinctus)</i> <i>(Frankliniella spp)</i>	0,4	14	(*) LANNATE BR aplicado a partir de 0,6 L/HA. presenta acción contra huevos de Lagarta perillera.	
	Alabama/oruga de la hoja Lagarta perillera (*) <i>(Alabama arguillacea)</i> <i>(Heliothis virescens)</i> <i>(Helicoverpa zea)</i> <i>(Prodenia eridania)</i>	0,3 a 0,4 0,8 a 1,5			
SOJA	Oruga de la soja Oruga plusia/verde Oruga militar Oruga del pastizal Broca de la vaina Cigarrita Mosca blanca Broca de las axilas Vaquita verde Vaquita de las solanáceas <i>(Anticarsia gemmatalis)</i> <i>(Pseudoplusia includens)</i> <i>(Spodoptera frugiperda)</i> <i>(Mocis latipes)</i> <i>(Etiella zinckenella)</i> <i>(Empoasca spp)</i> <i>(Bemisia tabaci)</i> <i>(Epinotia aporema)</i> <i>(Diabrotica speciosa)</i> <i>(Epicauta atomaria)</i>	0,3 a 0,5 0,5 a 1,0          1,0 a 2,0	14		
	TRIGO	Pulgón amarillo Pulgón verde oscuro Pulgón oscuro Oruga de la espiga Oruga militar Oruga del pastizal <i>(Metopolophium dirhadum)</i> <i>(Sitobion avenae)</i> <i>(Rhopalosiphum spp)</i> <i>(Pseudaletia adultera)</i> <i>(Spodoptera frugiperda)</i> <i>(Mocis latipes)</i>	0,5 a 1,3	14	
	TOMATE	Broca pequeña de los frutos Broca grande de los frutos Trips Pulgón Chinche <i>(Neoleucinodes elegantis)</i> <i>(Heliothis virescens)</i> <i>(Frankliniella spp)</i> <i>(Myzus persicae)</i> <i>(Phitia picta)</i> <i>(Corythaica cyathicollis)</i>	1,0 a 2,0 (100 a 200 ml/100 lts. de agua)	3	

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (L/HA)	PERIODOS DE CARENCIA (DIAS)	
COLES BROCOLI REPOLLO	Oruga del repollo Oruga medidora Polilla de las crucíferas Pulgón <i>(Ascia monuseste orseis)</i> <i>(Tricoplusia ni)</i> <i>(Plutelia macupileennis)</i> <i>(Brevicoryne brassicae)</i>	1,0 a 2,0 (100 a 200 ml/100 lts. de agua)	3	
BATATA	Pulgones Vaquita de las Solanáceas Pijo blanco Oruga Minador de las hojas <i>(Macrosiphum euphorbiae)</i> <i>(Myzus persicae)</i> <i>(Epicauta atomaria)</i> <i>(Pseudococcus maritimus)</i> <i>(Phthorimaea operculella)</i> <i>(Liriomyza spp)</i>	100 ml/100 lts. de agua	9	
TABACO	Pulgón del tabaco Lagarta/oruga de la yema Marandová/oruga Pulgones <i>(Epterix fasciata)</i> <i>(Heliothis virescens)</i> <i>(Phlegethontius carolina paphus)</i> <i>(Macrosiphum euphorbiae)</i> <i>(Myzus persicae)</i>	1,0 a 2,0	3	Uso no alimenticio Iniciar las aplicaciones después del transplante del tabaco
MAIZ	Oruga del cartucho (*) Oruga de las espigas <i>(Spodoptera frugiperda)</i> <i>(Helicoverpa zea)</i>	0,6	14	(*) En caso de aplicación dirigida al cartucho, para control de S. frugiperda, aplicar 0,3 l/ha. considerando una faja de aplicación de 25 cm.
MANI	Trips Oruga cabeza roja <i>(Frankliniella spp)</i> <i>(Thrips tabaci)</i> <i>(Stegasta bosquella)</i>	1,0 a 2,0	14	

## ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO: Lannate® BR - Bula (Folleto) 10 litros - Paraguay / Del Agro  
 CÓDIGO: LNPY10133B / A00000000 - ROTULO BULA LANNATE 2X10LT PY DEL AGRO  
 FORMATO: 326 x 138 mm - IMPRESSÃO: Pantone 185 C / Pantone 274 C / Preto  
 DATA: 01/10/2013 - LNPY10133B.EPS



# Lannate® BR

INSECTICIDA SISTÉMICO Y DE CONTACTO

Grupo Químico: CARBAMATO

Concentrado Emulsionable (EC)

## Composición química:

METOMIL: S-methyl N-(methylcarbamoxyloxy) thioacetimidate.....	215 g/L (21,5% m/v)
Ingredientes inertes.....	785 g/L (78,5% m/v)

Nº DE REGISTRO - SENAVE: 861

LIBRE VENTA Nº: 540

FABRICADO POR

DU PONT DO BRASIL S.A.

Alameda Itapecuru, 506 - CEP 06454-080

Alphaville - Barueri - SP - Brasil

Tel.: 0800-707 5517

REGISTRANTE Y REPRESENTANTE

**AGAR CROSS**

AGAR CROSS PARAGUAYA S.A.

Registro entidad comercial A.4 - A.7 SENAVE Nº 3

Acá Carayá Nº 546

Tel./Fax: 595-21-205.722 - Asunción - Paraguay

IMPORTADO POR:

CENTRO DEL AGRO S.A.

Av. Mcal. Francisco S. López km 4

Fracción el Pinar

Ciudad del Este

PARAGUAY

LOTE Nº: ver en envase

FECHA DE FABRICACIÓN: ver en envase

FECHA DE VENCIMIENTO: ver en envase

"Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto"

CLASE TOXICOLOGICA Ib - MUY PELIGROSO

CONTENIDO NETO:

**10 LITROS**



LNPY10133F / A0000000



**TOXICO**



## Lannate® BR

### Introducción

Lannate es un insecticida con acción de choque que actúa por contacto e ingestión, el cual está recomendado para controlar gran número de plagas de diferentes cultivos, es eficaz contra algunos insectos como *Heliothis virescens* (en Algodonero) resistente a los insecticidas tradicionales. Pertenece al grupo de los carbamatos y su principio activo es el Methomyl con una concentración del 21,5%.

### Sintomatología

Los efectos sobre los insectos pueden ser observados a los pocos minutos de haber aplicado Lannate.

### Recomendaciones de uso

Las dosis por hectáreas dependerán del insecto a tratar (ver tabla) Lannate es un producto líquido que debe ser mezclado con suficiente volumen de agua que asegure una cobertura uniforme y completa del área a tratar. Las menores dosis se aplicarán cuando los insectos son jóvenes y los intervalos de aplicación mas cortos.

### Lannate en el medio ambiente

Methomyl no se acumula en la cadena alimentaria, porque las plantas y microorganismos lo transforman en compuestos comunes a la naturaleza, como agua, CO<sub>2</sub>, amonio.

® Lannate es marca registrada de  
E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

LNPY10133B / A0000000