

Lontrel™ XC

HERBICIDE

L'herbicide Lontrel™ XC améliore la suppression du chardon des champs et d'autres mauvaises herbes à feuilles larges difficiles à contrôler dans les champs de maïs et d'autres grandes cultures.

POURQUOI UTILISER L'HERBICIDE LONTREL XC™ ?

- **Il s'attaque à la racine du problème :** L'herbicide Lontrel XC est systémique dans les mauvaises herbes vivaces. Il se transporte dans les parties aériennes et souterraines des mauvaises herbes. Cela lui permet de lutter plus efficacement, pour plus longtemps, contre les plantes vivaces telles que le chardon des champs et le laïteron des champs.
- **Performance unique sur les mauvaises herbes difficiles à supprimer :** Lontrel XC vous aide à nettoyer vos champs en ciblant certaines des mauvaises herbes les plus résistantes comme le chardon des champs et la vesce.
- **Facile à utiliser :** La préparation XC plus concentrée vous aide à couvrir plus d'hectares avec le contenu de chaque bidon. Le Lontrel XC est facile à mélanger en réservoir. Il dispose d'une large fenêtre d'application ; jusqu'au stade huit feuilles du maïs-grain.

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES¹

- Trèfle alsike
- Chardon des champs
- Sénéçon vulgaire
- Laïteron des champs (parties épigées)
- Herbe à poux
- Trèfle rouge
- Matricaire inodore
- Vesce
- Luzerne spontanée
- Trèfle blanc
- Renouée liseron

MAUVAISES HERBES (RÉPRESSION)

- Marguerite blanche
- Petite oseille

¹La performance du Lontrel XC dépend de la dose.
*Se référer aux doses d'utilisation indiquées sur l'étiquette pour les différentes cultures.

DIRECTIVES D'APPLICATION DE LONTREL XC

DOSES ET SUPERFICIES TRAITÉES

Dose :

- 69 à 202 ml/ac*
- Volume d'eau
- 10 à 20 gal É.-U./ac

EMBALLAGE

Caisse :

- 4 bidons de 2,67 L chacun

QUAND L'APPLIQUER :

- **Canola (Ontario seulement) :** 2 à 6 feuilles
- **Maïs-grain :** plantule jusqu'à 8 feuilles (V6)
- **Rutabagas :** à appliquer lorsque la petite herbe à poux atteint entre 5 et 10 cm
- **Betteraves à sucre :** cotylédon à 8 feuilles
- **Blé, orge (printemps) :** 3^e feuille jusqu'à la feuille étendard
- **Blé (d'hiver) :** De trois talles à juste avant la feuille étendard

- **Stade de la mauvaise herbe :** Appliquer au chardon des champs, au laïteron des champs et à la matricaire inodore du stade de la rosette jusqu'à avant le stade bouton

RÉSISTANCE AU LESSIVAGE PAR LA PLUIE :

- 4 heures

INFORMATION SUR L'APPLICATION DE LONTREL XC

Maïs (grain, ensilage ou pâturage) tolérant au glyphosate :

Appliquer Lontrel XC seul ou en mélange en réservoir avec du glyphosate. Appliquer lorsque le maïs-grain se situe entre les stades plantule et huit feuilles.

69 ml/acre : Mélanger en réservoir avec du glyphosate pour améliorer la suppression du chardon des champs*, des pissenlits**, du laitron des champs et de la renouée liseron.

101 ml/acre : Chardon des champs (parties aériennes), vesce jargeau et trèfle alsike. Ne pas appliquer sur le maïs sucré, le maïs de semence et le maïs soufflé.

* parties aériennes toute la saison, ** <15 cm de diamètre (parties aériennes toute la saison), >15 cm de diamètre (répression)

Céréales (blé d'automne, blé d'hiver, blé durum, orge) :

69 à 101 ml/acre : Pour une suppression améliorée du chardon des champs ainsi que des mauvaises herbes listées sur l'étiquette du mélange en réservoir, mélanger en réservoir avec du 2,4-D ester ou amine, MCPA ester ou amine.

Canola (Ontario seulement) :

101 ml/acre : Appliquer au stade 2 à 6 feuilles de la partie aérienne du canola pour la suppression du chardon des champs.

Betterave à sucre :

138 à 202 ml/acre : Pour la suppression du chardon des champs et d'autres mauvaises herbes à feuilles larges apparaissant sur l'étiquette, faire une application à la volée ou en bande sur le rang.

Rutabaga :

138 ml/acre : Pour supprimer la petite herbe à poux, appliquer Lontrel XC quand les plants atteignent entre 5 à 10 cm de haut.

ROTATION DES CULTURES :

Est du Canada : Les champs déjà traités à l'herbicide Lontrel XC avec jusqu'à 101 ml/acre peuvent être semés l'année suivante avec blé, avoine, orge, seigle (non sous-semés avec des légumineuses, comme du trefle ou de la luzerne), graminées fourragères, lin, canola, moutarde, soyas*, petits pois* ou betterave à sucre*.

*Se référer à l'étiquette pour des recommandations plus détaillées.

DIRECTIVES DE MÉLANGE

Ordre de mélange : Le Lontrel XC est une préparation herbicide soluble dans l'eau. Il devrait être ajouté à la cuve du pulvérisateur après les herbicides secs et avant d'ajouter des herbicides concentrés émulsifiables. Ajoutez le glyphosate en dernier dans le réservoir. Maintenir l'agitation durant tout le processus de mélange et durant l'application.

DÉLAI AVANT RÉCOLTE (DAR) :

Rutabaga : 83 jours

Betterave à sucre : 90 jours

Blé durum : 60 jours

Maïs-grain : Pour le maïs aux champs, ne pas laisser le bétail pâturer sur les aires traitées ou s'alimenter de maïs des champs traités comme ensilage pour 40 jours après le dernier traitement.



Glyphosate seulement
9 JAA



Lontrel XC + glyphosate
9 JAA



Lontrel XC + glyphosate
24 JAA



Lontrel XC + glyphosate
24 JAA

JAA – jours après l'application