



# EL PULGÓN NO ES BIENVENIDO

- PROTECTOR UNA CLARA VENTAJA EN PROTECCIÓN A LOS SORGOS PIONEER
- REDUCE RIESGOS, Y ASEGURA EL RENDIMIENTO DE LA COSECHA







Visítanos en [www.corteva.mx](http://www.corteva.mx) | [www.pioneer.com/mx](http://www.pioneer.com/mx)

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2023 Corteva



## EXCELENTE POTENCIAL DE RENDIMIENTO ALTA TOLERANCIA A PULGÓN AMARILLO



	<b>CIÉNEGA</b>	<b>BAJÍO</b>
 <b>ZONAS RECOMENDADAS</b>	Jalisco y Michoacán	Guanajuato, Michoacán, Querétaro
 <b>DENSIDAD DE SIEMBRA</b>	16-18 kg/ha	18 kg/ha
 <b>FECHA DE SIEMBRA</b>	01 abril - 30 junio	01 abril - 30 mayo
 <b>CICLO</b>	Intermedio - tardío	Intermedio - tardío
 <b>DÍAS A FLORACIÓN</b>	80 - 85 días	80 - 85 días
 <b>DÍAS A COSECHA</b>	165 - 170 días	170 - 175 días
 <b>ALTURA DE PLANTA</b>	1.70 - 1.80 m	1.70 - 1.80 m
 <b>TIPO DE PANOJA</b>	Semi - abierta	Semi - abierta

\*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



# EXCELENTE SANIDAD ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO ALTA TOLERANCIA A PULGÓN AMARILLO



	CIÉNEGA	BAJÍO
 <b>ZONAS RECOMENDADAS</b>	Jalisco y Michoacán	Michoacán, Guanajuato, Querétaro
 <b>DENSIDAD DE SIEMBRA</b>	16-18 kg/ha	18 kg/ha
 <b>FECHA DE SIEMBRA</b>	15 abril - 30 junio	01 mayo - 15 junio
 <b>CICLO</b>	Intermedio	Intermedio
 <b>DÍAS A FLORACIÓN</b>	75 - 80 días	70 - 75 días
 <b>DÍAS A COSECHA</b>	165 - 170 días	165 - 170 días
 <b>ALTURA DE PLANTA</b>	1.70 - 1.80 m	1.70 - 1.80 m
 <b>TIPO DE PANOJA</b>	Semi - abierta	Semi - abierta

\*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



**TOLERANCIA A SEQUÍA**  
**TU OPCIÓN EN REDIMIENTO PARA EL TEMPORAL Y CIERRES DE SIEMBRA**  
**ALTA TOLERANCIA A PULGÓN AMARILLO**



	<b>CIÉNEGA</b>	<b>BAJÍO</b>
 <b>ZONAS RECOMENDADAS</b>	Jalisco y Michoacán	Michoacán, Guanajuato, Querétaro
 <b>DENSIDAD DE SIEMBRA</b>	16-18 kg/ha	16 - 18 kg/ha
 <b>FECHA DE SIEMBRA</b>	15 mayo - 10 julio	15 mayo - 30 junio
 <b>CICLO</b>	Intermedio - precoz	Intermedio - precoz
 <b>DÍAS A FLORACIÓN</b>	70 - 72 días	70 - 72 días
 <b>DÍAS A COSECHA</b>	155 - 165 días	155 - 165 días
 <b>ALTURA DE PLANTA</b>	1.55 - 1.60 m	1.55 - 1.60 m
 <b>TIPO DE PANOJA</b>	Semi - abierta	Semi - abierta

\*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico